

## RED DE ALERTA E INFORMACIÓN FITOSANITARIA



### PROTOCOLO DE CAMPO PARA EL SEGUIMIENTO DEL CULTIVO

**Melón**

**Octubre 2020**



**Unión Europea**  
Fondo Europeo Agrícola  
de Desarrollo Rural



**Junta de Andalucía**  
Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible

# ÍNDICE

<b>1.- INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1.-¿Qué es la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF)?.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2.-¿Cómo se transmite la información recopilada en la RAIF? .....</b>	<b>2</b>
<b>2.- RECOPIACIÓN DE DATOS .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1.-Estaciones de control biológico (ECB) .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2.-Instalación de trampas.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3.-Metodología de muestreo .....</b>	<b>6</b>
<b>2.4.-Muestreos periódicos .....</b>	<b>7</b>
<b>2.5.-Dudas y aclaraciones más frecuentes.....</b>	<b>8</b>
<b>3.- PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA WEB.....</b>	<b>10</b>

## ANEJOS:

---

**Anejo nº 1: Esquema de funcionamiento de la RAIF**

**Anejo nº 2: Metodología de muestreo: Seguimiento detallado de cada uno de los agentes**

**Anejo nº 3: Instalación de trampas**

**Anejo nº 4: Variables de la aplicación Triana a cumplimentar en la RAIF**

**Anejo nº 5: Información contenida en la página web de la RAIF**

## 1.- Introducción

### 1.1.- ¿Qué es la Red de Alerta e Información Fitosanitaria?

Entre los cometidos del **Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía** figuran, entre otros, la vigilancia y el control del estado fitosanitario de los cultivos, así como los controles sanitarios de determinados vegetales o productos vegetales que, procedentes del territorio andaluz, tengan por destino cualquier otro punto, bien sea del propio territorio o de fuera de él.

Por este motivo, en **1996** se puso en marcha por primera vez la **Red de Alerta e Información Fitosanitaria** en Andalucía, en adelante **RAIF**.

Desde el comienzo constituyó una idea pionera en España que pretendía, mediante la adecuada formación de una serie de técnicos de campo especializados, cumplir con los siguientes objetivos:

- **Vigilar** en el espacio y en el tiempo el estado fitosanitario de los principales cultivos de Andalucía, especialmente aquellos cultivos y aquellas plagas o enfermedades objeto de la Directiva CE, y a los efectos allí contemplados, usando los sistemas de seguimiento de plagas y enfermedades más avanzados.
- **Gestionar** toda la información sobre la situación fitosanitaria de los cultivos que es posible obtener a partir de todas las fuentes de las que se dispone en Andalucía (datos de API – asociación de producción integrada- y técnicos RAIF).
- Poder **dar una respuesta** a la creciente demanda de información a todos los niveles (sector agrícola, demandantes de la propia administración autonómica, MAPA, etc.).
- Realizar **actuaciones especiales** cuyo fin sea la recogida de datos sobre plagas que preocupen especialmente al sector debido a la problemática que plantean, aprovechando para ello la red de estaciones de control que componen la RAIF.

Para cumplir con estos objetivos, la RAIF cuenta en la actualidad con un equipo formado por más de **700 técnicos especializados**, entre API y técnicos RAIF, realizando el seguimiento de las principales plagas y enfermedades que afectan a los cultivos de ajo, algodón, almendro, arroz, cereales de invierno, cítricos, fresa,

frutos rojos, hortícolas protegidos, olivo, patata, remolacha azucarera, tomate para transformación industrial, vid y zanahoria, y continúa incorporando progresivamente nuevos cultivos de importancia para Andalucía, como, en el caso que nos ocupa en este documento, el **melón**. También cuenta con una red de **más de 200 estaciones meteorológicas automáticas** (en adelante EMA).

Los programas **TRIANA**, específicos para cada cultivo y diseñados por la propia Junta de Andalucía, son los encargados de recopilar y explotar todo el volumen de información que posteriormente se publica en la página web.

En el anejo nº 1 se adjunta el esquema de funcionamiento de la RAIF.

## **1.2. - ¿Cómo se transmite la información recopilada en la RAIF?**

Para cumplir con el objetivo de informar se ha creado una página web en la que se presenta la información que se ha considerado de mayor interés para todos los usuarios.

A ella se accede a través de la página de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. La dirección es la siguiente:

<https://www.juntadeandalucia.es/agriculturapescayderollorural/raif>

Esta página se ha estructurado de manera que el usuario pueda consultar a golpe de vista toda la información que se le ofrece.

- Consultar directamente el **“Boletín Autonómico”** que es un resumen de la información más interesante ocurrida en la comunidad autónoma.
  - **Informe mensual**, de forma más detallada se informa de los aspectos fitosanitarios más relevantes ocurridos en el transcurso del mes en Andalucía.
  - **Informes históricos**, permite conocer el estado fitosanitario de los cultivos en años anteriores por semanas.
  - **Balances anuales**, permite acceder a los distintos balances fitosanitarios fin de campaña de los cultivos de años anteriores.
- Consultar los **“Boletines provinciales”**. La información se ha estructurado de manera que el usuario pueda consultarla a varios niveles.
  - **Informes históricos**, permite conocer el estado fitosanitario de los cultivos en años anteriores por semanas. El disponer de información de las condiciones fitosanitarias en campañas pasadas sirve para poder analizar comparativamente su estado en el presente. Se pueden conocer las condiciones ambientales, nivel de ataque de los diferentes agentes,

fenología y prácticas realizadas en el cultivo que se dieron en ese momento puede ayudar en el desarrollo de la campaña actual.

- **Balances anuales**, permite acceder a los distintos resúmenes fin campaña de cada provincia.
- **Informes semanales**, de forma más detallada se informa de los aspectos fitosanitarios más relevantes ocurridos en el transcurso de la semana en cada una de las provincias andaluzas. En ellos se expone semanalmente la situación e incidencia de las plagas y enfermedades, el estado fenológico, las prácticas realizadas, información meteorológica y las recomendaciones para facilitar el buen estado fitosanitario de los diferentes cultivos de la provincia. El usuario puede acceder además a la información del cultivo que más le interese, con información puntual sobre los aspectos principales de estos.


Seleccionando la provincia se accede al **boletín fitosanitario provincial**, y a los cultivos dentro de cada provincia, se accede a la información correspondiente a dicho cultivo: información puntual sobre los **aspectos principales del cultivo**.

A través de esta página se puede consultar los informes autonómicos y provinciales de cada provincia desde el año 2006.

- Consultar las "**gráficas provinciales**", información de la evolución y muestran el comportamiento en el tiempo de las distintas plagas y enfermedades. La representación gráfica que se muestra, se ha hecho en base a los resultados obtenidos de índices de capturas en trampas, muestreos puntuales para conocer la situación concreta del agente, gráficas con datos meteorológicos y su incidencia sobre la plaga o enfermedad y gráficas donde se combina la presencia de agentes concretos y los tratamientos realizados.
- Consultar otra información de interés como pueden ser plagas destacadas, producción integrada - normativa, sustancias autorizadas, manuales de campo, eventos...

Otro aspecto de gran importancia es que el usuario interprete correctamente los datos que proporciona la RAIF, para lo cual se debe tener presente lo siguiente:

- **La información del cultivo del melón se dará por término municipal.** Además, con objeto de facilitar la ubicación de cada invernadero de melón se ha incluido un mapa con la distribución de las explotaciones acogidos a este plan.



- **La información referente a cada plaga o enfermedad** que se refleja en cada zona biológica, **es generalmente la media aritmética de los valores obtenidos en las distintas estaciones de control**, que tiene la RAIF, en esa zona biológica (según cultivos) determinada. En el mapa correspondiente se puede consultar el número de estaciones de control (o explotaciones acogidas al plan de ayuda para el control de insectos vectores) que hay ubicadas en cada zona biológica.

Con el fin de facilitar la interpretación de los mapas, se han incluido unas leyendas de colores que indican la mayor o menor intensidad con que se está manifestando una plaga y/o enfermedad. En la leyenda, los colores cálidos (amarillo y sobre todo rojo) hacen siempre referencia a las mayores intensidades de plaga y/o enfermedad. Sin embargo, este dato no debe relacionarse con la necesidad de realizar intervenciones fitosanitarias contra una plaga y enfermedad concreta. **No se trata de una estación de avisos**, ya que este tipo de decisiones fitosanitarias implica tener en cuenta un mayor número de parámetros (condiciones específicas de la parcela) que no pueden ser controladas por la RAIF. Por lo tanto, la aparición de este tipo de colores en un mapa refleja la **idoneidad de vigilar las parcelas y realizar muestreos específicos para poder tomar las decisiones adecuadas**.

En definitiva, la información de la **RAIF** debe ayudar a conocer la situación del cultivo a lo largo de la campaña, incluso debe servir para saber los momentos más oportunos o críticos en los que la vigilancia de la parcela es más importante.

Sin embargo, nunca se debe utilizar esta información sin más para justificar la realización de un tratamiento fitosanitario contra una plaga y/o enfermedad, ya que la toma de este tipo de decisiones implica, además de realizar un muestreo específico en la parcela, tener en consideración el resto de parámetros que deben intervenir a la hora de tomar tan importante decisión.

## 2.- Recopilación de datos

Para la realización de muestreos de plagas y enfermedades, el **Reglamento Específico de Producción Integrada de Cultivos Hortícolas Protegidos (tomate, pimiento, berenjena, judía, calabacín, pepino, melón y sandía)** (Orden de 10 de octubre de 2007, publicado en BOJA 211 de 25 de octubre de 2007) establece la obligación de estimar el riesgo provocado por plagas y enfermedades que afectan al cultivo en cada parcela mediante evaluación de los niveles poblacionales, estado de desarrollo de las plagas y fauna útil, fenología del cultivo y condiciones climáticas, de acuerdo con "Estrategia de Control Integrado" establecida en el cuadro correspondiente al cultivo del **melón** (anexo 2 de dicho reglamento).

En el anejo nº 2 de este protocolo: "Metodología del muestreo: Seguimiento detallado de cada uno de los agentes" se puede consultar una explicación sobre los **muestreos a realizar sobre los distintos agentes que afectan al cultivo, cuyo resultado se ha de facilitar a la RAIF ([artículo 13.2.f de la Orden de 13 de diciembre del 2004 \(Boja 247 de 21 de diciembre 2004\)](#))**.

Para la correcta realización de la estrategia de control en una ECB es necesario realizar los siguientes pasos:

- Seleccionar la estación de control biológico conforme a una serie de criterios que la hagan representativa y homogénea.
- Instalar en ella las trampas necesarias.
- Realizar los muestreos periódicos.

A continuación, se explica cada uno de estos pasos.

### 2.1.- Estaciones de control biológico (ECB)

Las ECB han de ser representativas de la zona biológica en la que estén situadas. Esta representatividad deberá estar referida a todos los ámbitos, como son:

- **planta:** variedad, fecha de plantación, cultivo anterior, etc.
- **suelo:** tipo de suelo, pendiente.
- **clima:** iluminación, temperaturas.
- **riego:** sistema usual de riego.

El número de ECB de las que debe aportar datos cada API a la RAIF queda establecido por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. En principio, el criterio a seguir será el siguiente:

- **API:** Proporcionarán a la RAIF los datos de 3 estaciones de control (cada 15 días). Estas ECB se seleccionarán de manera que estén equidistantes, con una distancia de 500-600 metros por municipio, siempre que en este existan más de 10 ha del cultivo. Si la entidad es tan pequeña como para que no pudiera disponer de 3 puntos, aportaría un número inferior, siempre de acuerdo con el Departamento de Sanidad Vegetal de la provincia y coordinados por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera.

## 2.2.- Instalación de trampas

El **Reglamento Específico de Producción Integrada de Cultivos Hortícolas Protegidos (tomate, pimiento, berenjena, judía, calabacín, pepino, melón y sandía)** establece, como medida preventiva, la colocación de distintos tipos de trampas:

- **Placas cromotrópicas amarillas** para el monitoreo o control de **mosca blanca** (*Bemisia tabaci*), **pulgones** (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae* y *Aphis craccivora*) y **minador de las hojas** (*Liriomyza trifolii*).
- **Placas cromotrópicas azules** para el monitoreo o control de **trips** (*Frankliniella occidentalis*).
- **Trampas con feromonas** para el seguimiento de poblaciones de **orugas de lepidópteros: heliothis** (*Helicoverpa armigera*), **rosquilla verde** (*Spodoptera exigua*), **rosquilla negra** (*Spodoptera littoralis*) y **plusia** (*Chrysodeixis chalcites*), y para el seguimiento de poblaciones de **trips** (*Frankliniella occidentalis*).

En el anejo nº 3, "Instalación de trampas", se realiza una descripción de dicha trampa y se detalla su forma, colocación, conteo, etc.

### 2.3.- Metodología de muestreo

La metodología de muestreo para el cultivo del melón, al igual que para el resto de cultivos hortícolas protegidos, es la que sigue a continuación:

**1)-** En cada **unidad homogénea de cultivo (UHC)** se establecerá como mínimo una estación de control (EC):

-En las UHC menores o iguales de 2 ha, se establecerá 1 EC.

-En las UHC mayor de 2 ha se dividirá en parcelas de 2 ha, estableciendo en cada una de ellas 1 EC.

**2)-** Cada **estación de control (EC)** se dividirá en 4 sectores (orientaciones NE, NO, SE, SO).

**3)-** Dentro de cada **sector** se elige la **unidad muestral primaria UMP** (planta):

- En las EC menores o iguales de 0.5 ha se hará un muestreo de 7 plantas.

- En las EC mayores de 0.5 ha se hará un muestreo de 10 plantas.

**4)-** Cada UMP se divide en **unidades de muestreo secundarias (UMS)**. En cada planta se muestrean en total 3 hojas, 3 flores y 3 frutos, niveles inferior, medio y superior.

**5)-** En las observaciones realizadas en el muestreo **se evaluarán los niveles poblacionales tanto de plaga como de fauna útil**. Los muestreos se harán con una periodicidad de 14 días excepto en aquellos casos en que el riesgo fitosanitario obligue a realizarlos con una periodicidad inferior.

**No obstante, se podrán proponer sistemas de muestreo alternativos a las establecidas en este apartado, siempre que estén justificadas técnicamente.**

### 2.4.- Muestreos periódicos

En general, están fijados por la estrategia de control integrado en el Reglamento de Producción Integrada (RPI). Sin embargo, **los datos que tienen mayor interés para la RAIF, en el caso de cultivos hortícolas, no cambiarán en función de la época del año y por ello se pedirán los mismos datos todas las semanas**

**(ficha RAIF).** Del mismo modo, en determinados momentos las necesidades de suministrar información pueden requerir la aportación de información no habitual.

Con objeto de homogeneizar para todos los agentes los parámetros en los que habría que introducir información en el **Triana**, en el anejo nº 4 se incluye la relación de variables o parámetros que son necesarios cumplimentar en estos casos. De este modo será posible hacer medias y comparar datos de todas las ECB muestreadas.

## **2.5.- Dudas y aclaraciones más frecuentes**

Debido a la enorme cantidad de datos que deben agruparse en la RAIF para proporcionar la información fitosanitaria, es imprescindible que estos estén suficientemente revisados y contrastados antes de aportarse a la red. Un único dato incorrecto puede alterar la media de toda una zona biológica y, como consecuencia, transformar una información coherente y que ha costado mucho esfuerzo recopilar en una información totalmente errónea. Por ello, hacer especial hincapié en la calidad de los datos aportados, es un objetivo prioritario de la RAIF.

Con el fin de minimizar los errores cometidos en el pasado, a continuación, se ha realizado una recopilación de las principales dudas que se abordaron la última campaña, y de las aclaraciones más importantes a las que se llegó.

### **2.5.1.-General**

**A la hora de rellenar el Triana, habrá que tener en cuenta lo siguiente:**

- **Los índices de capturas en trampas** para una plaga son el resultado de sumar todos los individuos capturados en las trampas existentes en la ECB para dicha plaga y dividirlo entre el número de trampas y el número de días transcurridos entre conteos (14 generalmente por tratarse de un seguimiento bisemanal). De no ser así, se debe indicar el número de días que realmente han transcurrido entre conteos.
- **Diferencia entre valor "0" y valor "en blanco":** A la hora de introducir valores en los campos de los distintos índices y agentes resulta esencial distinguir la trascendencia de colocar un "0" o dejar ese campo "en blanco". Es preciso recordar que hay una clara diferencia entre introducir un "0" en un determinado campo y dejarlo en blanco, indican situaciones diferentes.

El valor "0" computa en el cálculo de las medias aritméticas que se utilizan para mostrar los valores alcanzados en las distintas zonas biológicas. Por el contrario, el valor "en blanco" no interviene en las medias. Las circunstancias en las que se requiere introducir cada uno de los valores son las siguientes:


- **Valor "0"**: Se introducirá el valor "0" siempre y cuando el agente evaluado se encuentre dentro del período de muestreo establecido y, una vez realizado el muestreo, no se haya observado su presencia o incidencia en la correspondiente ECB.
  - **Campo en blanco**: No se introducirá valor alguno, es decir, se dejará en blanco siempre y cuando el agente evaluado no se haya muestreado, bien cuando se encuentre fuera del período de muestreo establecido, o cuando las variables obligatorias a rellenar para ese agente hagan referencia a otros estados fenológicos que no sean el actual del cultivo. También se dejará en blanco si por ejemplo debido al deterioro o pérdida de las trampas no se dispone del dato en una semana determinada.
- Es importante comprobar si un campo se refiere a **porcentajes**. En ese caso, el valor no puede ser superior a 100.
- Aunque no afecta a los datos que se aportan a la RAIF, es importante recordar que **el hecho de que se superen los criterios o umbrales mínimos establecidos tan sólo justifica una posible intervención, pero no obliga a efectuarla.**

Será necesario sopesar también otros factores de importancia, como la habitual evolución de la plaga en la zona, la climatología esperada, **la presencia o no de fauna auxiliar**, la efectividad del tratamiento conforme a las condiciones específicas de la plaga o enfermedad en ese momento, etc.

### 3.- **Publicación de información en la web**

La página web de la RAIF (dentro de la dirección de la Junta de Andalucía) publica semanalmente la situación fitosanitaria información de diferentes cultivos de Andalucía. En el caso del melón se publicará un informe semanal sobre la situación de dicho cultivo en la provincia.

**Anejo nº 1**  
**Esquema de funcionamiento de la RAIF**



**Anejo nº 2**  
**Metodología de muestreo:**  
**Seguimiento detallado de cada uno de los agentes**

El documento que debe servir de base para aplicar la metodología de muestreo en campo es el **Reglamento Específico de Producción Integrada de Cultivos Hortícolas Protegidos (tomate, pimiento, berenjena, judía, calabacín, pepino, melón y sandía)** (Orden de 10 de octubre de 2007, publicado en BOJA 211 de 25 de octubre de 2007).

Por otra parte, toda la información relativa a la biología, morfología, descripción de daños, etc. para cada uno de los agentes se puede encontrar en la amplia bibliografía existente sobre el tema. Por este motivo, no se considera necesario realizar este documento más extenso de lo imprescindible.

De este modo, el presente anejo se centra exclusivamente en aquellos aspectos que pueden presentar dificultad de cara a lograr que todos los técnicos involucrados interpreten del mismo modo el Reglamento y cumplimenten de forma homogénea la información que es necesario proporcionar a la RAIF.

## 1.- Periodicidad de las observaciones

Las parcelas de muestreo se observarán quincenalmente. En cada una de las reuniones semanales de los departamentos se definirán los campos a cumplimentar obligatoriamente cada semana en la aplicación Triana.

## 2.- Resumen de los tipos de muestreo que hay que realizar

A continuación, se detallan los agentes a observar en cada una de las estaciones de control por cada unidad muestral secundaria (UMS), según el Reglamento de Producción Integrada.

En cada una de las parcelas o ECB se realizará un **control generalizado de todos los agentes a muestrear. De forma que, en un recorrido por toda la parcela, el técnico estimará los niveles de daño de cada uno de los agentes a observar.**

A continuación, se detalla la forma de actuación y las anotaciones a realizar en la aplicación Triana.

### 3.- Fenología

La fenología nos sirve para comparar el retraso o adelanto de unos años con otros, y también para comparar unas zonas con otras; en otros casos, momentos óptimos de tratamiento.

#### ➤ Observación en campo

Quincenalmente, y durante toda la campaña, se tomarán los datos de fenología del cultivo en cada parcela de muestreo y anotarán el estado fenológico dominante (EFD), más atrasado (EF-) y más adelantado (EF+) del momento.

MELÓN	
ESTADOS FENOLÓGICOS	
1	Plantación – Inicio Floración.
2	Floración – Inicio Recolección.
3	Recolección – Final del cultivo.

### 4.- Plagas y enfermedades

En este apartado, se explica agente por agente, la forma de realizar el muestreo en campo y las variables a incorporar en el Triana Cultivos.

#### 4.1.- Araña roja (*Tetranychus urticae*)

En el melón podemos encontrar varias especies de ácaros, siendo el tetraníquido ***Tetranychus urticae*** el más común.

El ciclo biológico es holometábolo, y consta de 4 estados de desarrollo: huevo, larva, dos estadios ninfales (protoninfa y deutoninfa) y adulto. Cada hembra adulta puede poner 100-120 huevos, con una frecuencia de 3-5 huevos/día. El desarrollo de todo este ciclo es muy rápido, completándose en una semana con temperaturas de 30 °C y ambiente seco. A medida que la temperatura descende, se alarga progresivamente hasta situarse en unos 14 días cuando esta es de 23 °C. A menos de 12 °C finaliza su desarrollo y entra en diapausa. A más de 40 °C se bloquea igualmente su desarrollo, produciéndose en este caso una gran mortalidad de los diversos estados.

Para sobrevivir en climas muy secos, estos ácaros forman colonias en las que tejen hilos de seda que pueden llegar a cubrir toda la planta, lo que favorece la aparición de un microclima resultante de la retención de humedad producida por la transpiración de la planta. Este microclima le permite sobrevivir y desarrollarse en condiciones extremas para otros ácaros, con humedades relativas bajas.

El **huevo** es esférico, liso y brillante. Su color es blanquecino, que se oscurece y toma un tono amarillento a medida que avanza su desarrollo. Mide entre 0.12-0.14 mm de diámetro.

La **larva** es de forma esférica. En sus primeros momentos de vida son incoloras y transparentes, cambian su color a verde claro, amarillo-marrón, o verde oscuro, según su alimentación. Posee dos manchas oscuras características en el dorso del tórax y tres pares de patas. Puede además apreciarse el color rojo de sus ojos. Mide unos 0.15 mm de longitud.

Posee dos estadios **ninfales**, protoninfa y deutoninfa. En ambos son del mismo color que las larvas, aunque las manchas en los laterales del dorso aparecen más grandes y nítidas. Poseen cuatro pares de patas.


En el estado **adulto** existe un claro dimorfismo sexual. La hembra adulta posee una forma ovalada y un tamaño aproximadamente de 0.50 mm de largo y 0.30 mm de ancho. El macho presenta un tamaño bastante inferior y un cuerpo más estrecho, con el abdomen puntiagudo y las patas proporcionalmente más largas.



Hembra adulta de *Tetranychus urticae*.



Diferentes estadios de desarrollo de *Tetranychus urticae*.



Huevos de *Tetranychus urticae*.

Los ataques suelen aparecer por focos, frecuentemente cerca de malas hierbas, especialmente de correhuelas y malvas que actúan de reservorios de la plaga.

En la planta se sitúa sobre todo en hojas jóvenes de la última brotación, pero en caso de fuertes ataques aparece sobre todo tipo de hojas, incluso en todas las partes de la planta.

Cuando la fuente nutritiva sobre la que se encuentra comienza a agotarse, se dispersa a través de los tejidos de seda que produce, en busca de otros huéspedes adecuados, o bien se refugia en lugares abrigados donde puede entrar en diapausa. El viento y el transporte del material vegetal son también medios para su dispersión.

Al alimentarse de células epidérmicas de los tejidos vegetales, producen una decoloración más o menos intensa. Como **primeros daños** se observan unas manchas amarillentas en el haz de las hojas. Con mayores poblaciones se produce desecación e incluso defoliación. Los ataques son más graves en los primeros estadios fenológicos de la planta. **No ocasiona daños indirectos.**



Decoloración y zonas secas en hojas de melón, y presencia de telas de araña producidas por *Tetranychus urticae*.

### ➤ Estimación del riesgo

- **Muestreos:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo, ya que las condiciones ambientales dentro del invernadero son propicias para su desarrollo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, las zonas más sensibles a ataques en el invernadero son aquellas cercanas a las puertas, ventanas o bordes del invernadero, por estar cerca de aberturas o rotos que pueden constituir la vía de entrada natural de determinados agentes.

Los ataques suelen aparecer en focos. Lo más importante es la detección precoz de los mismos y es el propio agricultor el que tiene que encontrar los primeros focos.

La detección de esta plaga en la planta suele ser en el envés de las hojas.

El **umbral de tratamiento** se supera con 1 foco/1000 m<sup>2</sup>. Cuando haya presencia de auxiliares en más del 50 % de las plantas con araña roja no será necesario realizar tratamientos. El inicio de las sueltas de organismos de control biológico se comenzará al detectar la primera presencia del ácaro.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en los siguientes apartados:

**Agente:**

**"Araña roja: % plantas con presencia"**

Se calcula como el número total de plantas con presencia de este ácaro tetraníquido, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Araña roja : \% Plantas con presencia} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ plantas con presencia}}{\text{N}^{\circ} \text{ plantas observadas}} \times 100$$

**Fauna auxiliar:**

**"*Amblyseius californicus*: % plantas con presencia"**

**"*Amblyseius swirskii*: % plantas con presencia"**

**"*Phytoseiulus persimilis*: % plantas con presencia"**

El conteo de insectos auxiliares se calcula como el número total de plantas con presencia de insectos auxiliares propios de este agente, dividido entre el número total de plantas muestreadas y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Agente auxiliar concreto : \% Plantas con presencia} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ plantas con presencia}}{\text{N}^{\circ} \text{ plantas observadas}} \times 100$$

## **4.2.- Mosca Blanca (*Bemisia tabaci*)**

La presencia de *Bemisia tabaci* en España es bien conocida desde los años 40, cuando fue citada sobre diversos cultivos como algodón, tabaco, y tomate. Al igual que en el resto del mundo, en los últimos años, se ha convertido en una plaga de gran importancia económica, especialmente en cultivos hortícolas protegidos.

Su ciclo biológico consta de cuatro estados: huevo, larva, pupa y adulto. A su vez, el estado de larva tiene tres estadios: I, II y III.

El **huevo** es elíptico y asimétrico, con coloración amarillo-verdosa. Acaba en una prolongación llamada pedicelo, mediante la cual se fija a la hoja quedando en posición vertical. Mide alrededor de 0.2 mm de longitud por 0.1 mm de ancho.

La **larva** en el primer estadio es de color blanco verdoso. Tiene forma elíptica, ventralmente plana y dorsalmente convexa. Posee antenas, y patas funcionales; sin embargo, es poco móvil, fijándose generalmente cerca del lugar de la puesta. Una vez fijada se produce la muda, transformándose en larva de segundo estadio, momento en el que tanto las antenas como las patas degeneran. Mide unos 0.3 mm de longitud. En este segundo estadio y en el tercero, se inmoviliza. Comienzan a manifestarse las ondulaciones que serán más apreciables en el último estadio larvario. A medida que avanza el desarrollo aumentan de grosor y tamaño, a la vez que el color se vuelve más opaco. Al final del desarrollo pueden alcanzar los 0.7 mm de longitud por 0.4 mm de ancho.

La **pupa** (también llamada Ninfa IV), presenta fuertes ondulaciones, lo que la asemeja a la caja de resonancia de una guitarra. El dorso se eleva en el centro, permaneciendo bajas las áreas marginales. No se aprecian las setas marginales. El color es más opaco que el adquirido en los estadios larvarios, y se observan los ojos compuestos de color rojo. La estructura pupal va a diferir dependiendo de la planta huésped. El adulto sale del pupario por una incisión que realiza en forma de T.

El **adulto** es de color amarillo-azufre y tiene ojos de color rojo oscuro-negros. Mide de 0.9 a 1 mm de longitud y 0.32 mm de anchura. La longitud de sus antenas es de 0.29 mm. Los machos solo pueden diferenciarse de las hembras mediante el estudio de sus genitales.



Adulto de *Bemisia tabaci*.



Pupa de *Bemisia tabaci*.




Larva de *Bemisia tabaci*.

La *Bemisia tabaci* coloca sus alas a modo de 'tejado' sobre su abdomen, formando un ángulo aproximado de 45° con el plano de la superficie de la hoja. Esta forma de plegar las alas sirve para diferenciarla de la otra especie de mosca blanca (*Trialeurodes vaporariorum*) que las posiciona de forma más horizontal.

Los adultos colonizan la planta desde el inicio del cultivo, aunque su aparición está condicionada por la climatología. El rango de temperatura para su desarrollo está entre 16 y 34 °C. Las temperaturas letales se sitúan por debajo de los 9 °C y por encima de los 40 °C. El umbral de temperatura para la oviposición es de 14 °C.

Las hembras realizan la puesta, preferentemente en el envés de las hojas más tiernas, aunque en algunos cultivos prefiere el haz. Los huevos son depositados de forma dispersa. Tanto los adultos como los estados inmaduros pueden localizarse en el envés de las hojas, donde llevan a cabo su actividad.

Los **daños directos** de esta plaga dependen de varios factores: la edad, estructura de la hoja, variedad y estado fisiológico. Los adultos hembra tienen preferencia para la alimentación y oviposición por las hojas más jóvenes y tiernas. Larvas y adultos se alimentan succionando la savia de las hojas. Si la población es muy elevada se puede llegar a producir un debilitamiento de la planta, clorosis y desecación de las hojas.



Negrilla asociada a *Bemisia tabaci* en hoja de melón.

Como **daños indirectos**, la melaza que segrega favorece el ataque del hongo que ocasiona la negrilla, merma la capacidad fotosintética de la planta, así como la respiración de esta, pudiendo además depreciar la calidad de la cosecha y dificultar la penetración de los fitosanitarios. Además, puede transmitir el virus CVYV (virus de las venas amarillas del pepino) así como el virus CYSDV (virus del enanismo amarillo del pepino).

## ➤ Estimación del riesgo

### • Muestreos:

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo, ya que las condiciones ambientales dentro del invernadero son propicias para su desarrollo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, las zonas más sensibles a ataques en el invernadero son aquellas cercanas a las puertas, ventanas o bordes del invernadero, por estar cerca de aberturas o rotos que pueden constituir la vía de entrada natural de determinados agentes.

La detección de esta plaga en la planta suele ser en el envés de las hojas.

El **umbral de tratamiento** se supera cuando el porcentaje de plantas ocupadas sea mayor del 50 % y el porcentaje de plantas con fauna auxiliar sea menor del 25 %. Las primeras sueltas de organismos de control biológico se realizarán al observar las primeras larvas de mosca blanca, con intervalos de una semana, hasta detectar un nivel alto de parasitismo en el cultivo (entre el 70 y el 80 %). Distribuir las sueltas en todo el cultivo, concentrando la misma en las zonas más propensas a entradas o de mayor riesgo.

### • Parámetros:

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en los siguientes apartados:

#### **Agente:**

**“Mosca blanca: % plantas con presencia”**

**“Virus de las venas amarillas del pepino: % plantas con síntomas”**

**“Amarilleamientos virales: % plantas con síntomas”**

Se calcula como el número total de plantas con presencia de este agente, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Mosca blanca : \% Plantas con presencia} = \frac{\text{N}^\circ \text{plantas con presencia}}{\text{N}^\circ \text{plantas observadas}} \times 100$$

#### Fauna auxiliar:

**"Eretmocerus mundus: % plantas con presencia"**

**"Encarsia formosa: % plantas con presencia"**

**"Amblyseius swirskii: % plantas con presencia"**

**"Nesidiocoris tenuis: % plantas con presencia"**

La presencia de los insectos auxiliares se calcula como el número total de plantas con insectos auxiliares propios de este agente, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Agente auxiliar concreto : \% Plantas con presencia} = \frac{\text{N}^\circ \text{plantas con presencia}}{\text{N}^\circ \text{plantas observadas}} \times 100$$

### 4.3.- Orugas

Las especies de lepidópteros más importantes que atacan al cultivo del melón son **heliothis** (*Helicoverpa armigera*, *Heliothis peltigera*), **rosquilla verde** (*Spodoptera exigua*), **rosquilla negra** (*Spodoptera littoralis*) y **plusia** (*Chrysodeixis chalcitos*, *Trichoplusia ni* y *Autographa gamma*).

El **heliothis** está extendido por todo el mundo, excepto en América. En esta subfamilia se engloban algunas de las plagas más perjudiciales, de gran variedad de cultivos, por su gran voracidad. Son además difíciles de controlar y afectan a las partes más valiosas de la planta: frutos y cápsulas.

El ciclo vital es holometábolo, la oruga pasa por los estados de huevo, larva con 5-6 estadios, pupa y adulto.

El **huevo** tiene forma redondeada, aunque es más alto que ancho. El tamaño es de unos 0.5 mm y por tanto pueden verse a simple vista. Es de color blanco recién puesto, posteriormente amarillento y finalmente vira a oscuro. Presenta estrías longitudinales. Son depositados de forma aislada.

La **larva** tiene la cabeza verde o pardo claro y el cuerpo es cilíndrico de coloración

amarillenta-verdosa. Presenta una línea lateral blanca por debajo de los estigmas y otra línea dorso lateral, con puntos negros y rojos o naranjas sobre fondo negro. La línea mediana dorsal es verde oscuro. Es característica la presencia de pequeños pelos que salen de unos "redondeles" blancos orlados de negro. Están dotadas de 3 pares de patas en el tórax y 5 pares de falsas patas en el abdomen. Las larvas de último estadio alcanzan una longitud de 3 a 3.5 cm.

La **pupa** o crisálida se suele encontrar dentro de una cápsula terrosa, al principio son verdosas para tornar a color pardo posteriormente. Su tamaño oscila entre 20-25 mm.



Huevos, larva y adulto, respectivamente, de *Helicoverpa armigera*.

El **adulto** presenta una envergadura alar de 3.5 a 4 cm. El macho es de color gris-verdoso y la hembra pardo anaranjado. Las alas anteriores son de color amarillo y en su margen externo tiene una fila de pequeños puntos negros y blancos juntos. Las alas posteriores son claras, con el margen amarillento y están atravesadas por una zona más oscura. El macho es de color gris-verdoso y la hembra pardo-naranja.

Suele pasar el invierno bajo el suelo en forma de crisálida, emergiendo los primeros adultos en los meses de abril-mayo. En cultivos bajo abrigo, sin embargo, pueden pasar el invierno en forma de larva, dado que las temperaturas alcanzadas en los cultivos no son extremas.

A pesar de que existen importantes variaciones poblacionales, puede decirse que los máximos de vuelo de adultos, según estudios realizados mediante trampas de luz y de feromonas, se producen en: enero-febrero, abril-mayo, junio-julio, agosto y por último en septiembre-octubre. Durante todo el ciclo, prevalecen los hábitos nocturnos, donde muestran una mayor actividad.

En cuanto a los **daños directos** que ocasionan, hay que decir que las larvas de esta especie son muy voraces y ocasionan serios daños en un corto espacio de

tiempo. Los primeros estadios larvarios se localizan sobre flores y hojas, de las que alimentan. Cuando la planta es pequeña puede "cegarla" al afectar también a la yema apical del tallo. Además, se alimenta de los frutos, causando importantes daños puesto que merma la cosecha. El hecho de que la hembra realice la puesta de forma aislada, facilita que pocos individuos puedan afectar a grandes áreas de un cultivo.

Por otro lado, las heridas ocasionadas por esta plaga facilitan la entrada de otros patógenos (hongos, bacterias, etc.).



Comeduras superficiales en fruto de melón producidas por *Helicoverpa armigera*.



Deformación de brote de melón producida por *Helicoverpa armigera*.

La **rosquilla verde** (*Spodoptera exigua*) está distribuida por África, el sur de Europa, Asia, Japón, Australia, Estados Unidos y Canadá. Es un insecto muy polífago que ataca a diversos cultivos herbáceos y plantas espontáneas, y que presenta una alta incidencia en las zonas del sur de España. Las campañas se solapan durante todo el año por lo que es imposible establecer el número de generaciones anuales en nuestra zona.

El ciclo vital es holometábolo, la oruga pasa por estados de huevo, larva, pupa y adulto y las condiciones climáticas óptimas para su desarrollo son de temperaturas y humedad elevadas y ambiente sombreado (20 °C y 90 % de humedad relativa).

Los **huevos** se encuentran normalmente depositados en pequeños grupos (10-250 huevos), recubiertos de escamas blancas, denominados ooplacas o plastones. De forma individual, cada huevo presenta una coloración que va del blanco al marrón-amarillento recién puestos, y marrón oscuro antes de su eclosión. Presentan también estrías verticales y una forma similar a la de una cúpula. El tamaño medio oscila de 0.35 a 0.37 mm.

La **larva** es de color variable, generalmente verde, aunque puede llegar a ser de color marrón, dependiendo de la alimentación e incluso de si están agrupadas (más oscura) o aisladas. Las larvas de los primeros estadios son de color blanquecino y cabeza negra. Las de los últimos estadios tienen la cabeza de color ocre, con un reticulado blanquecino, poseen manchas y líneas a lo largo del cuerpo, tienen 3 pares de patas torácicas y 5 pares de falsas patas abdominales. Pasan normalmente por cinco estadios. Su tamaño es de 1 mm en larvas recién nacidas, y alcanzan los 30 a 40 mm cuando están totalmente desarrolladas.

La **pupa** es de color verde al principio, tomando después color hueso-marrón. Está provisto de cuatro ganchos en su parte inferior, cuya función es la sujeción del adulto al emerger de la crisálida. El tamaño medio es de 20 mm.

El **adulto** posee una envergadura alar de 2.5 a 3 cm. Las alas anteriores son de color marrón terroso a gris. Tienen dos manchas: orbicular y renal de colores anaranjados características, que destacan del resto. Las alas posteriores son blancas con nerviaduras más oscuras y el borde de las mismas es de color marrón negruzco difuso.



Huevos de *Spodoptera exigua*.

Larvas de *Spodoptera exigua*.

Adultos de *S. exigua*.

Las puestas las realizan preferentemente en el envés de las hojas más bajas. La distribución inicial de las larvas es de varios ejemplares preferentemente en el envés de las hojas de las zonas apicales de las plantas. A medida que van desarrollándose, tienden a aislarse colonizando otras partes del vegetal y plantas vecinas. Es por tanto una **infestación por focos**, más o menos aislados o separados en función de la distribución de las puestas realizadas sobre el cultivo. Debido al desplazamiento de las larvas, los focos pueden llegar a solaparse o unirse. En invernaderos con ausencia de mallas en las bandas, la entrada de los adultos resulta fácil. En teoría las puestas serían más abundantes en las plantas cercanas a dichas bandas, siendo estas el punto de inicio de la infestación, pero no siempre sucede así.

Las larvas en sus primeros estadios larvarios tienen comportamiento gregario, ocasionando **daños directos** royendo el parénquima de la cara inferior de las hojas, y dejando la epidermis. En los siguientes estadios se distancian y aíslan, devoran las hojas al completo, producen graves defoliaciones, pudiendo también roer los tallos llegando a perforar galerías. En ataques graves se pueden apreciar daños en frutos.

Por otro lado, las heridas que ocasionan, facilitan la entrada de otros patógenos (hongos, bacterias, etc.).

La **rosquilla negra** (*Spodoptera littoralis*), es una especie muy polífaga que afecta principalmente a cultivos hortícolas y ornamentales, sobre todo en las zonas del litoral Mediterráneo y sur de España. Al igual que *S. exigua*, tiene un fuerte carácter migratorio, existiendo fuertes fluctuaciones en sus poblaciones según la época del año. Normalmente los primeros adultos empiezan a aparecer en primavera, aunque son difíciles de ver por ser de hábitos nocturnos y permanecer ocultos durante el día.

Su ciclo vital es holometábolo, pasa por los estados de huevo, larva, pupa y adulto. Una vez eclosionados los huevos, las larvas soportan un rango muy amplio de temperaturas comprendido entre 6-37 °C.

Los **huevos** son depositados en masas u ooplacas de 400 a 700 unidades (en condiciones favorables), y recubiertos de una masa algodonosa de escamas anales de la hembra. Tienen un tamaño aproximado de 0.5 mm.

Las **larvas** tienen una cabeza de color marrón oscuro o negro. El cuerpo de coloración negruzca, tiene aspecto aterciopelado. Cada segmento presenta una mancha lateral de forma semilunar negra y el primero presenta además cuatro puntos a modo de collar. Los primeros segmentos del tórax son más oscuros que el resto del cuerpo. Las patas torácicas (3 pares) son negras, mientras que las falsas (5 pares) abdominales son de color marrón oscuro por su cara externa y claras en su cara interna. En su último estadio larvario puede alcanzar un tamaño de 3.5 cm.

La **pupa** es de color marrón rojizo. Tiene forma fusiforme y está provista de dos ganchos en la parte inferior en forma de "U" curvados hacia dentro. Su tamaño es de 2 cm.

Los **adultos** poseen una envergadura alar de 3 a 4.5 cm. Son de color marrón claro pero escriturados de múltiples manchas, con dibujos poco definidos a base de gris, negro y blanco como colores predominantes. Las manchas alares son estrechas, poco definidas. En la mitad del ala presenta una marca oblicua, marrón clara, que

parte del borde anterior hasta difuminarse en los nervios medianos. Las alas posteriores son de color blanco, traslúcidas, salvo los bordes anteriores y externos que están teñidos de marrón.



Larvas de *Spodoptera littoralis*.

Adultos de *Spodoptera littoralis*.

Las puestas son realizadas en las horas que preceden a la salida del sol, y se localizan en el envés de las hojas, aunque también se han observado en botones florales, brotaciones o incluso a pocos centímetros del suelo, e incluso en las estructuras (palos, plásticos, etc.) de los invernaderos.

Su comportamiento en los primeros estadios es igual al de la **rosquilla verde**, y también son los mismos los daños producidos, tanto directos como indirectos.

La **plusia** (*Chrysodeixis chalcites*), es el plúsidio más importantes que afecta al cultivo del melón en el sureste español. Es polífago y migratorio, lo que dificulta establecer un calendario referente a las épocas en las que ataca.

El ciclo vital es holometábolo. La oruga pasa por estados de huevo, larva, pupa y adulto. El ciclo biológico es continuo, y en él se superponen los distintos estados, pudiendo pasar el período invernal en forma de larva, ya que presenta una notoria resistencia al frío. Las características de estos estados para *Chrysodeixis chalcites* y *Autographa gamma* son muy similares.

El **huevo** tiene forma de cúpula, y es de color blanquecino, con textura estriada.

La **larva** tiene la cabeza pequeña, afilada, de color verde, con una raya lateral negra. El cuerpo es de color verde intenso. Posee líneas laterodorsales finas de color blanco. El cuerpo es afilado y se engrosa hacia el final. Posee 3 pares patas torácicas y tres pares de falsas patas abdominales. Llega a medir 3.5 cm de longitud en su último estadio.

La **pupa** se encuentra en el interior de un capullo sedoso en las hojas de la planta cultivada o en las de plantas adventicias (malas hierbas). Su color hueso al principio y verde después, va oscureciéndose hacia el final del desarrollo. Mide unos 2 cm de longitud.

El **adulto** posee de 4 a 4.5 cm de envergadura alar. Las alas anteriores tienen un color marrón-dorado. La diferencia radica en las marcas de sus alas. Presenta dos manchas oblicuas de color plata, ribeteadas de blanco.



Huevo, larva y adulto, respectivamente de *Chrysodeixis chalcites*.

La localización de la plaga y los daños va a depender del estado fenológico del cultivo. En plantas jóvenes se sitúan en las partes tiernas. Las larvas en sus primeros estadios de desarrollo son de hábitos nocturnos y se sitúan en el envés de las hojas. En plantas adultas es difícil precisar la distribución, habiéndose encontrado larvas en todos los niveles, ya que los movimientos de desplazamiento son bastante amplios.

Cuando son pequeñas se alimentan del parénquima de las hojas, observándose comeduras en el envés de éstas. En los siguientes estadios larvarios se vuelven más voraces, las comeduras son más grandes, atravesando toda la hoja. Para un cultivo totalmente desarrollado, la presencia de larvas pequeñas no supone daños apreciables. Sin embargo, en un cultivo recién trasplantado, pueden llegar a “cegar” la planta, afectando a la yema apical.

El daño principal que ocasiona al cultivo es la **defoliación**, sobre todo en **plantaciones jóvenes**. Aunque las puestas las realizan de forma individual, la rapidez con que evolucionan las larvas favorece la concentración de varias en una misma planta o plantas cercanas, lo que aumenta el grado de afectación de ésta. En cuanto a **daños indirectos**, las heridas ocasionadas por esta plaga facilitan la entrada de otros patógenos (hongos, bacterias, etc.).

### ➤ **Estimación del riesgo**

- **Muestreos:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo, ya que las condiciones ambientales dentro del invernadero son propicias para su desarrollo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, las zonas más sensibles a ataques en el invernadero son aquellas cercanas a las puertas, ventanas o bordes del invernadero, por estar cerca de aberturas o rotos que pueden constituir la vía de entrada natural de determinados agentes.

La detección de esta plaga en el cultivo se realizará fundamentalmente en los frutos y tallos en el caso de heliothis, y en las hojas, y en menor medida en los frutos, en el caso de rosquilla verde.

El **umbral de tratamiento** se supera cuando se hayan detectado los primeros daños.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre estos agentes se realizarán en el programa Triana-Cultivos en los siguientes apartados:

**Agente:**

**“Orugas: % plantas con larvas o daños recientes”,**

Se calcula como el número total de plantas con larvas o daños recientes producidos por larvas de orugas (excepto *Tuta absoluta*), dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Orugas : \% Plantas con larvas o daños recientes} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ plantas con larvas o daños recientes}}{\text{N}^{\circ} \text{ plantas observadas}} \times 100$$

**“Orugas: % frutos con daños”**

Se calcula como el número total de frutos con daños por larvas de orugas dividido entre el número total de frutos muestreados u observados, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Orugas : \% Frutos con daños} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ frutos con daños}}{\text{N}^{\circ} \text{ frutos observados}} \times 100$$

**Fauna auxiliar:****"Steinernema carpocapsae: % plantas con presencia"**

La presencia de los insectos auxiliares se calcula como el número total de plantas con presencia de insectos auxiliares propios de este agente, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Agente auxiliar concreto : \% Plantas con presencia} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ plantas con presencia}}{\text{N}^{\circ} \text{ plantas observadas}} \times 100$$


**4.4.- Pulgones (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae* y *Aphis craccivora*)**

Los pulgones son insectos que afectan a numerosos cultivos herbáceos, incluso arbóreos. El **pulgón del algodón** (*Aphis gossypii*), junto al **pulgón verde del melocotonero** (*Myzus persicae*) y el **pulgón negro de las leguminosas** (*Aphis craccivora*), son las especies más problemáticas para el cultivo del melón.

Una característica especial de estas plagas es la **viviparidad**, cuando la reproducción es partenogenética. Esto significa que la hembra pare directamente a las ninfas que se han desarrollado previamente en su interior. Esta característica permite un rápido crecimiento de las poblaciones, ya que todos los individuos de la colonia originan nuevas ninfas, sin que exista un tiempo previo, como ocurre con las plagas ovíparas. Las ninfas recién nacidas contienen ya embriones en desarrollo en su interior.



Adulto alado, adulto áptero y larva de *Aphis gossypii*.



Hembra alada y adulto áptero de *Myzus persicae*.



Hembras ápteras de *Aphis craccivora*.

Los pulgones se distribuyen en cultivos de invernadero, normalmente por **focos**. Las primeras colonias suelen formarse en las zonas cercanas a las bandas. Cuando existe un importante desarrollo de las plantas, o una gran cobertura vegetal en el momento de la invasión, los pulgones ven limitada su distribución y permanecen normalmente en las bandas. Sin embargo, si existe menor densidad y cubierta vegetal, como sucede en estados fenológicos más tempranos, la distribución de los pulgones es más aleatoria y puede alcanzar a toda la parcela.

Se sitúan normalmente en el **envés de las hojas**. La distribución en plantas de una misma calle o línea es unas tres veces más rápida que en plantas de líneas o calles distintas, variando también según la densidad del cultivo y el marco de plantación.

Los **daños directos** se producen al absorber el pulgón la savia de las plantas, provocando un debilitamiento generalizado, que se manifiesta en un retraso en el crecimiento y amarilleamiento de la planta, lo cual está en relación con la población de pulgones que soporta. Además, durante la alimentación, los pulgones inyectan saliva que contiene sustancias tóxicas ocasionando deformaciones de hojas, como enrollamiento y curvaturas.



Abarquilleamiento en hoja de melón producido por pulgones.

Los **daños indirectos** se producen por la transmisión de algunos virus. *Aphis gossypii* y *Myzus persicae*, pueden transmitir el virus CMV (Virus del mosaico del pepino), el virus WMV-2 (Virus del mosaico de la sandía-2), el virus ZYMV (Virus del mosaico amarillo del calabacín). Además, la melaza segregada por estas plagas favorece el ataque del hongo que ocasiona la negrilla, que merma la capacidad fotosintética de la planta, así como la respiración de esta. Además, puede depreciar la calidad de la cosecha y dificultar la penetración de los fitosanitarios.

### ➤ **Estimación del riesgo**

- **Muestreos:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo, ya que las condiciones ambientales dentro del invernadero son propicias para su desarrollo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, las zonas más sensibles a ataques en el invernadero son aquellas cercanas a las puertas, ventanas o bordes del invernadero, por estar cerca de aberturas o rotos que pueden constituir la vía de entrada natural de determinados agentes.

Los ataques suelen aparecer en focos. Lo más importante es la detección precoz de los mismos, y es el propio agricultor el que tiene que localizar los primeros focos. Si hay fauna auxiliar, se recomienda medir el nivel de parasitismo.

La detección de esta plaga suele ser en las hojas, en las zonas de crecimiento de la planta.

El **umbral de tratamiento** se supera cuando se haya detectado más de 1 foco/1000 m<sup>2</sup>. Se considerará que la plaga está bajo control cuando los niveles de parasitismo sean superiores al 60 %.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en los apartados siguientes:

**Agente:**

**"Pulgón: % plantas con presencia".**

**"Virus mosaico del pepino: % plantas con síntomas".**

**"Virus mosaico amarillo del calabacín: % plantas con síntomas".**

**"Virus mosaico de la sandía-2: % plantas con síntomas".**

**"Virus del amarilleo de las cucurbitáceas transmitidos por pulgones".**

Se calcula como el número total de plantas con presencia de pulgones, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Pulgones : \% Plantas con presencia} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{plantas con presencia}}{\text{N}^{\circ} \text{plantas observadas}} \times 100$$

**"Momias: % plantas con presencia".**

Se calcula como el número total de plantas con presencia de pulgones parasitados "**momias**", dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Momias : \% Plantas con presencia} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{plantas con presencia}}{\text{N}^{\circ} \text{plantas observadas}} \times 100$$

**Fauna auxiliar:**

**"*Adalia bipunctata*: % plantas con presencia".**

**"*Aphidius colemani*: % plantas con presencia".**

**"*Aphidoletes aphidimyza*: % plantas con presencia".**

**"*Chrysoperla carnea*: % plantas con presencia".**

**"*Lysiphlebus testaceipes*: % plantas con presencia".**

Para la anotación de la presencia de los insectos auxiliares se calcula el número total de plantas con presencia de insectos auxiliares propios de este agente, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Agente auxiliar concreto : \% Plantas con presencia} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{plantas con presencia}}{\text{N}^{\circ} \text{plantas observadas}} \times 100$$

#### 4.5.- Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Se trata de un insecto polífago que coloniza y parasita un gran número de plantas cultivadas y espontáneas. La mayor parte de las hortalizas, los frutales de hueso, algunos frutales tropicales, cítricos y algunas ornamentales.

El **huevo** es transparente y con forma arriñonada al principio y blanquecino en el momento de la eclosión.

La **larva** neonata es blanquecina, de 0.4 mm y va adquiriendo coloración amarillenta a medida que se alimenta y se va desarrollando.

Los **estados ninfales** son estados de transición en los que el insecto no se alimenta, ni se mueve apenas.

Los **adultos** recién formados son totalmente claros, resaltando el color oscuro de la zona terminal de las antenas. Son alargados y de pequeño tamaño. Tiene dos pares de alas completamente desarrolladas, transparentes, alargadas y terminadas en punta.



Adulto de *Frankliniella occidentalis*.



Larva de *Frankliniella occidentalis*.

La duración del ciclo biológico depende de la temperatura, de la naturaleza del hospedante y de la calidad y cantidad del alimento disponible. En invernaderos, la duración del ciclo completo es muy corto, sólo 14 días a 26 °C. El número de

generaciones se acorta con temperaturas altas, pudiendo presentarse hasta 12-15 generaciones por año en cultivos en invernadero, existiendo normalmente un solape entre las generaciones.

La presencia de *F. occidentalis* a lo largo del año es ininterrumpida, encontrándose formas en todos sus estados.

El trips puede estar presente en diversas zonas de la planta: hojas, flores y frutos. Los adultos, principalmente las hembras, muestran preferencia por las flores. La dispersión de los trips se da tanto de forma activa, volando o flotando en corrientes de aire, como pasivamente por movimiento de personas, plantas o materiales.



Placas plateadas en hojas de melón producidas por *F. occidentalis*.



Daños en fruto de melón por alimentación de *F. occidentalis*.

Los **daños directos** se producen por dos mecanismos diferentes. Por picaduras alimentarias por parte de adultos y larvas que vacían las células del parénquima, haciendo que pierdan su coloración propia. El tejido afectado adquiere, al principio, un tono blanquecino o plateado y, más tarde se deseca tomando coloración marrón. También por el efecto de la puesta. Al introducir las hembras el huevo debajo de la epidermis de las hojas, se produce una herida que puede llevar a la aparición de verrugas prominentes. Cuando la infección es alta puede dañar los frutos.

### ➤ Estimación del riesgo

- **Muestreos:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo, ya que las condiciones ambientales dentro del invernadero son propicias para su desarrollo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, las zonas más sensibles a ataques en el invernadero son aquellas cercanas a las puertas, ventanas o bordes

del invernadero, por estar cerca de aberturas o rotos que pueden constituir la vía de entrada natural de determinados agentes.

La detección de esta plaga suele ser en toda la planta en general (hojas, flores y frutos). El **umbral de tratamiento** se supera cuando haya más del 2 % de frutos dañados y/o plantas con presencia de trips.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en los apartados siguientes:

**Agente:**

**"*F. occidentalis*: % plantas con presencia"**

Se calcula como el número total de plantas con presencia de trips, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{F.occidentalis : \% Plantas con presencia} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ plantas con presencia}}{\text{N}^{\circ} \text{ plantas observadas}} \times 100$$

**"*F. occidentalis*: % frutos con daños".**

Se calcula como el número total de frutos dañados por trips, dividido entre el número total de frutos muestreados u observados, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{F.occidentalis : \% Frutos dañados} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ frutos dañados}}{\text{N}^{\circ} \text{ frutos observados}} \times 100$$

**Fauna auxiliar:**

**"*Amblyseus swirskii*: % plantas con presencia"**

**"*Nesidiocoris tenuis*: % plantas con presencia"**

La presencia de los insectos auxiliares se calcula como el número total de plantas con presencia de insectos auxiliares propios de este agente, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Agente auxiliar concreto : \% Plantas con presencia} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ plantas con presencia}}{\text{N}^{\circ} \text{ plantas observadas}} \times 100$$

#### 4.6.- Minador de las hojas (*Liriomyza trifolii*)

Actualmente *Liriomyza trifolii* es la principal especie de dípteros-minadores de hojas que afectan al cultivo del melón, y todos los cultivos hortícolas en general. Al igual que el resto de especies de minadores, es muy polífaga. Se desarrolla en el interior de las hojas, a las que provoca daños en sus estructuras, al realizar galerías o minas.

El insecto pasa por los estados de huevo, 3 fases larvianas, pupa y adulto. El ciclo comienza con la ovoposición. El adulto hembra inserta un único huevo por picadura en el interior de la hoja. Realiza movimientos rotatorios sobre su abdomen para aumentar la abertura de la picadura.

Los **huevos** son de 0.25 mm de longitud y 0.10 mm de anchura, ovalados, su color es blanco traslúcido que con el desarrollo del embrión vira a blanco transparente. Son insertados dentro del tejido de la hoja.

La **larva** es de forma cilíndrica, ápoda (sin patas) y acéfala (sin cabeza). Pasa por tres estadios larvianos. Al principio es blanca, pero en los estadios mayores se vuelve de coloración amarillenta. Alcanzado su máximo desarrollo llega a medir 2.7 mm de longitud.

La **pupa** se asemeja a un pequeño tonel. Su coloración oscila de amarillento oscuro a marrón claro. Las tonalidades son más amarillentas en esta especie, y más terrosas para el resto de las especies del género *Liriomyza*. Mide de 1.6 mm a 1.9 mm de longitud.



Adulto de *Liriomyza* sp.



Pupa de *Liriomyza* sp.

El **adulto** tiene apariencia de pequeña mosca de 1.4 a 2.3 mm de longitud. Presenta una coloración amarillenta, con manchas negras y tiene las alas claras. Existe en un claro dimorfismo sexual: el macho es de color amarillo y negro (antenas y patas amarillas, tórax negro), presenta la cara dorsal del abdomen de color amarillo y negro, con bandas transversales; la hembra es parecida al macho, pero en el abdomen presenta una mancha amarilla muy pronunciada. El tamaño es algo mayor que el del macho.

La duración del ciclo está influenciada por la temperatura y alimento, fundamentalmente; existiendo algunas variaciones según especies. Como valor medio puede citarse una duración de 16 días a 25 °C. Además de la temperatura, otros factores abióticos que influyen en la duración del ciclo son la humedad y la luz.

En cultivos bajo abrigo las generaciones se suceden durante todo el año, llegando a alcanzar hasta 9-10 generaciones/año. Su reproducción es por vía sexual. Los umbrales de desarrollo se sitúan en torno a los 9 °C y los 35-40 °C, cuando afectan al cultivo del tomate.

Los **daños directos** se producen cuando los adultos para alimentarse o para realizar la puesta producen picaduras en las hojas. Las larvas, al alimentarse del parénquima foliar, realizan galerías que posteriormente se necrosan. Estos daños reducen la capacidad fotosintética de la planta.

Los **daños indirectos** se originan cuando las heridas ocasionadas por esta plaga facilitan la entrada de otros patógenos (hongos, bacterias, etc.).



Adulto de *Liriomyza* sp. y punteaduras en cotiledón y en hoja de melón.



Galerías en hoja de melón producidas por *Liriomyza* sp.

### ➤ Estimación del riesgo

- **Muestreos:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo, ya que las condiciones ambientales dentro del invernadero son propicias para su desarrollo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, las zonas más sensibles a ataques en el invernadero son aquellas cercanas a las puertas, ventanas o bordes del invernadero, por estar cerca de aberturas o rotos que pueden constituir la vía de entrada natural de determinados agentes.

La plaga se detecta en las hojas de la planta.

El **umbral de tratamiento** se supera cuando se observe más del 20 % de plantas dañadas y, además, el nivel de parasitismo no alcance el 70 % de las galerías. Las primeras sueltas de organismos de control biológico se realizarán al aparecer los primeros daños en las plantas, con larvas vivas.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en los siguientes apartados:

**Agente:**

**“Minador: % plantas con larvas vivas”**

Se calcula como el número total de plantas con larvas vivas de minador, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Minador : \% Plantas con larvas vivas} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{plantas con larvas vivas}}{\text{N}^{\circ} \text{plantas observadas}} \times 100$$

#### Fauna auxiliar:

##### "*Diglyphus isaea*: % plantas con presencia"

La presencia de los insectos auxiliares se calcula como el número total de plantas con presencia de insectos auxiliares propios de este agente, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Agente auxiliar concreto : \% Plantas con presencia} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{plantas con presencia}}{\text{N}^{\circ} \text{plantas observadas}} \times 100$$

#### 4.7.- Nematodos

El género ***Meloidogyn*** es el más común de los nematodos encontrados en el cultivo del melón y dentro de éste, las especies *M. javanica*, *M. arenaria*, *M. incognita* y *M. hapla*.

Los nematodos son gusanos microscópicos no segmentados que constituyen el grupo más abundante de animales multicelulares en el suelo. Son una plaga polífaga, que ataca a más de 2000 especies, donde se incluyen la mayoría de las plantas cultivadas. Ocupan la mayoría de hábitats.

Generalmente pasan el invierno en el suelo en forma de **huevos**. En primavera a medida que la temperatura del suelo aumenta, los juveniles de segundo estadio J2s, eclosionan, emigran por la tierra y penetran en las raíces de las plantas hospedadoras, donde se establecen en lugares de alimentación. Durante el crecimiento, los juveniles engordan y mudan hasta convertirse en hembras adultas o machos. Las hembras son redondeadas e inmóviles, los machos son filiformes y generalmente abandonan la raíz porque no se alimentan.

Las **hembras** producen hasta 3000 huevos dentro de una masa gelatinosa. Generalmente los nematodos agalladores completan su ciclo en menos de un mes dependiendo de la temperatura del suelo y por tanto pueden tener varias generaciones durante un cultivo.



Hembra de *Meloidogyne* sp.

Como otros muchos nematodos no causan **síntomas** característicos en las hojas o parte aérea de la planta. Las plantas infectadas por *Meloidogyne* sp. muestran amarilleo, marchitamiento y reducciones de la producción. La infección de las raíces produce engrosamientos característicos o agallas que pueden ser de distintos tamaños dependiendo del número de hembras que alberguen.

### ➤ **Estimación del riesgo**

- **Muestreos:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo, ya que las condiciones ambientales dentro del invernadero son propicias para su desarrollo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. Es importante conocer el historial de la parcela, para así poder actuar en consecuencia. Las zonas más sensibles a ataques en el invernadero son aquellas con cierta humedad en el terreno, ya que ésta facilita su dispersión en el suelo.

La detección de la plaga en la planta se realiza, en primer lugar, por un amarilleo y marchitamiento de la planta. Y, en segundo lugar, al arrancar la planta, sospechosa de estar afectada por este agente, la presencia de "agallas" o abultamientos en las raíces.

El **umbral de tratamiento** se supera cuando se observen los primeros daños en las plantas. En parcelas con presencia anterior de nemátodos, se podrá realizar tratamiento antes incluso de la aparición de esos primeros daños.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en el apartado:

**Agente:**

**"Nematodos: % plantas con presencia".**

Se calcula como el número total de plantas con presencia de nematodos, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Nematodos : \% Plantas con presencia} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ plantas con presencia}}{\text{N}^{\circ} \text{ plantas observadas}} \times 100$$

#### **4.8.- Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)**

Parásito inespecífico que ataca a un alto número de especies vegetales, afectando a todos los cultivos protegidos de Almería. Puede comportarse como parásito y saprofito.

Este hongo se desarrolla óptimamente en condiciones de alta humedad relativa (95 %) y temperatura ambiental entre 17 y 25°C. Siendo la humedad el factor más limitante para la infección. Una excesiva fertilización nitrogenada y situaciones de estrés (hídrico, térmico, luminoso...) sensibilizan a la planta frente a la infección por este hongo. La planta es más vulnerable en la proximidad de la cosecha de los primeros frutos.

Este hongo es capaz de sobrevivir en el suelo o en restos vegetales, dentro del invernadero o en las lindes de éste. El transporte se realiza por el viento o el agua, depositándose sobre las flores, hojas, ramificaciones de la planta o frutos. Los frutos son invadidos a partir de la corola. Es la presencia de agua libre sobre las plantas lo que favorece las contaminaciones.

Las pérdidas más importantes debidas a esta enfermedad se observan anualmente entre los meses de diciembre a marzo, en los cultivos bajo invernadero. Los síntomas de la enfermedad son variables, pero en general producen podredumbres

blandas, recubiertas de un característico moho gris. En semillero y trasplante produce "caída de plántulas".

Los **primeros puntos de infección son las hojas y flores**. En el tallo el ataque se produce a través de lesiones y heridas, las cuales provocan pudriciones en las zonas afectadas, y en muchos casos, marchita toda la planta por encima de la lesión. Respecto a las flores, cuando caen sobre las hojas provocan una necrosis alrededor del punto de contacto que avanzará en condiciones favorables. Este hongo provoca la caída de las flores, ya que son muy sensibles, mermando la producción. En los frutos, la enfermedad suele comenzar a partir de restos de flores, picaduras de insectos, etc. Y se producen podredumbres grisáceas y curvamiento del ápice.

### ➤ **Estimación del riesgo**

- **Muestreos:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo, siendo los meses más críticos desde diciembre a marzo, ya que las condiciones ambientales dentro del invernadero son más propicias para su desarrollo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero.

La detección se realiza en todos los órganos aéreos de la planta: hojas, flores, tallos y frutos.

El **umbral de tratamiento** se supera cuando se observen los primeros síntomas del hongo en las plantas. En parcelas con antecedentes de esta enfermedad se podrán realizar tratamientos preventivos a criterio del técnico responsable.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en el apartado:

**Agente:**

**"Podredumbre gris: % plantas con presencia".**

Se calcula como el número total de plantas con presencia de este hongo, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello

multiplicado por 100.

$$\text{Podredumbre gris : \% Plantas con presencia} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ plantas con presencia}}{\text{N}^{\circ} \text{ plantas observadas}} \times 100$$

#### **4.9.- Mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis*)**

Está considerada como una enfermedad de climas áridos y húmedos, causando importantes epidemias en cultivos al aire libre y protegidos. Se encuentra distribuida por todo el mundo, tanto en cucurbitáceas silvestres como cultivadas. En Almería se tiene referencia de esta enfermedad con anterioridad a 1977.

Las condiciones climáticas óptimas para el desarrollo de la enfermedad son de temperaturas suaves (15 a 25 °C) y humedades muy altas (80-90 %). La presencia de agua libre sobre las hojas es imprescindible para la infección. Temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C detienen su desarrollo. Esta enfermedad se desarrolla tanto en cultivos protegidos como al aire libre, siendo en invernadero donde se encuentra el microclima más adecuado para su desarrollo.

Las esporas son dispersadas muy fácilmente por el viento, las corrientes de aire, las salpicaduras de agua y escorrentías consecutivas a fuertes lluvias o riegos por aspersión. El viento cálido y húmedo asegura el transporte de las esporas a largas distancias. Gracias a contaminaciones sucesivas el mildiu puede generalizarse en grandes superficies a partir de una zona de producción que actúa como foco.

La enfermedad se manifiesta **sólo en hojas**, observándose tanto en viejas como jóvenes. Al principio aparecen manchas en el haz de color verde claro, y después amarillentas con formas angulares. En el envés se forma un fieltro gris-violáceo en el que se producen las esporas del hongo. Posteriormente estas manchas se necrosan, tomando aspecto apergaminado. Los pecíolos permanecen verdes, sosteniendo a las hojas secas completamente, pero unidas al tallo. El potencial de esporulación es más elevado en lesiones cloróticas, siendo despreciable en las necróticas.



Manchas de aspecto apergaminado en hojas de melón afectadas por *Pseudoperonospora cubensis*.



Hojas de melón con manchas poligonales y aspecto aceitoso producidas por *Pseudoperonospora cubensis*.

### ➤ Estimación del riesgo

#### • Muestreos:

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo, ya que las condiciones ambientales dentro del invernadero son más propicias para su desarrollo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. Es una enfermedad muy grave una vez establecida, por lo que es muy importante su detección precoz. Tiene la misma importancia en los tres estados fenológicos.

La detección de esta enfermedad en la planta es en las hojas, tallos y frutos.

El **umbral de tratamiento** se supera cuando se observen plantas con síntomas del hongo, y se den las condiciones favorables para su desarrollo (H.R. >90 % y temperatura entre 10 y 25 °C). En parcelas con antecedentes de la enfermedad se podrán realizar tratamientos preventivos en época de riesgo a criterio del técnico responsable, basados en condiciones climáticas y estado de desarrollo de la planta.

#### • Parámetros:

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en el siguiente apartado:

#### **Agente:**

**"Mildiu de las cucurbitáceas: % plantas con presencia"**

Se calcula como el número total de plantas con presencia de mildiu, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Mildiu del melón : \% Plantas con presencia} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{plantas con presencia}}{\text{N}^{\circ} \text{plantas observadas}} \times 100$$

#### **4.10.- Oídio de las cucurbitáceas (*Sphaerotheca fuliginea*)**

Es un hongo que se encuentra distribuido por todo el mundo. Las pérdidas más notables que causa son una disminución de la calidad de los frutos más que de la producción.

En nuestras condiciones climáticas suele aparecer al comienzo de la primavera, tanto al aire libre como en invernadero. Domina en condiciones secas invernaderos bien ventilados o al aire libre en período estival. La temperatura de crecimiento del oídio está relacionada con la humedad y con la luz. El óptimo de temperatura se sitúa entre 23-26 °C. La humedad relativa óptima para el crecimiento de *Sphaerotheca fuliginea* es de aproximadamente un 70 %. Contrariamente a muchos hongos parásitos de las cucurbitáceas, los oídios no necesitan la presencia de una película de agua sobre las hojas para desarrollarse. Además, se produce un estancamiento de la epidemia en épocas de lluvia.

Las principales fuentes de inóculo las constituyen las malas hierbas (sobre todo de la familia de las compuestas) y otros cultivos de cucurbitáceas, así como los restos de cultivo. La enfermedad se transmite a partir de las esporas llevadas por el viento.

Se producen manchas pulverulentas de color blanco en la superficie de las hojas (haz y envés), también afecta a tallos y peciolo. Las hojas y tallos atacados se vuelven de color amarillento y se secan, e incluso las hojas secas se desprenden. Los frutos raramente son afectados, aunque cuando la enfermedad está muy avanzada, éstos pueden madurar prematuramente y carecer de sabor. Este daño es mayor sobre frutos jóvenes. Es el cultivo más resistente al oídio.



Manchas pulverulentas blancas en hojas de melón por *Sphaerotheca fuliginea*.

### ➤ Estimación del riesgo

- **Muestreo:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo, ya que las condiciones ambientales dentro del invernadero son más propicias para su desarrollo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. La detección de la enfermedad en la planta es en las hojas.

El **umbral de tratamiento** se supera cuando se observen plantas con síntomas del hongo y se den las condiciones favorables para su desarrollo. En parcelas con antecedentes de la enfermedad se podrán realizar tratamientos preventivos en época de riesgo a criterio del técnico responsable, basados en condiciones climáticas y estado de desarrollo de la planta.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en el siguiente apartado:

**Agente:**

**“Oídio de las cucurbitáceas: % plantas con presencia”**

Se calcula como el número total de plantas con presencia de oidiopsis, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Oidiopsis : \% Plantas con presencia} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ plantas con presencia}}{\text{N}^{\circ} \text{ plantas observadas}} \times 100$$

#### 4.11.- Podredumbre de cuello y raíz

La podredumbre de cuello y raíz en el melón está producida por una o más especies de hongos, como ***Phytophthora sp.***, ***Pythium sp.***, ***Rhizoctonia sp.***, y ***Fusarium sp.***, principalmente.

***Phytophthora***: la aparición de esta enfermedad se ve favorecida por la humedad del suelo elevada y por temperaturas comprendidas entre los 15 y 26 °C. El hongo puede ser transportado por el agua de riego, la cual puede estar contaminada por los residuos arrojados a las charcas o a las acequias, cuando no se tiene la ventaja de disponer de una fuente o de un pozo de riego propio. Los daños producidos por este hongo afectan a gran número de plantas cultivadas y provocan diferentes síntomas dependiendo de la especie de que se trate. En semillero y transplante produce marchitamiento, podredumbre de cuello y raíz y "caída de plántulas".

***Pythium***: dentro de este género hay especies muy polífagas, afectan principalmente a plántulas de cultivos hortícolas, ornamentales, extensivos y forestales. Las causas que favorecen el desarrollo de estos hongos son las humedades elevadas en el sustrato o suelo y temperaturas comprendidas entre 30 y 40 °C, incrementándose su acción suelos arcillosos, salinos y con arenas muy finas. El hongo llega a la explotación normalmente a través de semillas infectadas, plantas enfermas, sustratos contaminados y aguas. La enfermedad se disemina a través del agua, conservándose en el suelo y restos de cultivo. Afecta a plántula produciendo "caída de plántulas" y marras de nascencia. El hongo afecta a semillas, plantas recién nacidas y raíces provocando marchitamiento y podredumbre. A veces en tallos y raíces se detecta la presencia de gomosis.

***Rhizoctonia***: la podredumbre de cuello y raíz producida por *Rhizoctonia solani* Kühn, actúa con unas condiciones óptimas de temperaturas comprendidas entre los 15 y 26 °C y suelos húmedos. Es un hongo ampliamente distribuido en el suelo, teniendo como huéspedes una amplia gama de plantas cultivadas y silvestres. Se dispersa a través de la lluvia y el viento. Se conserva también en los restos vegetales como saprófito o bien con los esclerocios en el suelo. En cultivos hortícolas protegidos produce "caída de plántulas" en semillero y transplante. Produce marchitamiento de la planta que rápidamente se hace irreversible, y podredumbre húmeda del cuello de color amarillo oscuro que luego se generaliza hasta las raíces. Cuando los tallos o los frutos entran en contacto con el suelo húmedo se producen podredumbres superficiales de contorno irregular, en las que se detecta a simple vista el micelio rojizo y los esclerocios pardos del hongo.

**Fusarium:** la fusariosis vascular del melón producida por *Fusarium oxysporum f.sp. melonis*, tiene una distribución geográfica de este hongo es mundial y en España se ha citado en Andalucía y Castilla La Mancha. En la actualidad existen en todo el mundo cuatro patotipos de la *f. sp. melonis*: R0, R1, R2, R1-2.

Es una enfermedad que ataca especialmente en primaveras frías o tardías. Cuando las temperaturas suben por encima de 30 °C, la enfermedad sufre una regresión, pero no desaparece. En general los síntomas de máxima gravedad se observan a los 18-20 °C. Una iluminación insuficiente o días cortos aumentan la enfermedad y la intensidad es mayor en condiciones secas. Los marchitamientos serán máximos cuando las temperaturas suban y disminuya la humedad relativa del aire. Este hongo es capaz de mantenerse en el suelo, viviendo de forma saprófita a partir de diversos compuestos orgánicos. Las semillas pueden estar contaminadas y aseguran la transmisión de la enfermedad. Esto ocurre raramente; lo normal es que el hongo sea diseminado por el viento, las salpicaduras o por medio del material y herramientas.

Puede atacar a la planta antes de su emergencia, en el estado de plántula y a las plantas desarrolladas sobre todo en el inicio de su fructificación. Es capaz de invadir el sistema vascular sin que haya herida alguna en él. En plantas enfermas es fácil encontrar varias raíces secundarias afectadas, de color marrón que terminan por necrosarse. En la parte aérea se han descrito dos tipos de sintomatologías: **amarilleamiento** (las hojas amarillean progresivamente y sólo por un lado de la planta, posteriormente se marchitan emitiendo un olor característico. En los tallos y peciolo se produce una necrosis longitudinal, a veces con exudaciones gomosas. Cuando la humedad es alta, la necrosis se recubre de un fieltro blanco que es cuerpo fructífero y vegetativo del hongo.); y **marchitamiento** (se produce un marchitamiento brusco de las plantas que evoluciona de la base al ápice. El tallo no presenta ningún síntoma externo.) En ambos síntomas el final es siempre la muerte de la planta.



Tallo de melón seco y necrosado producido por *Fusarium oxysporum f.sp. melonis*.



Podredumbre en fruto de melón producida por *Fusarium oxysporum f.sp. melonis*.

### ➤ Estimación del riesgo

- **Muestreo:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo, ya que las condiciones ambientales dentro del invernadero son más propicias para su desarrollo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero.

La detección de estas enfermedades se realizará en el cuello y raíces de las plantas.

El **umbral de tratamiento** se supera cuando se observen plantas con síntomas del complejo de hongos y se den las condiciones favorables para su desarrollo (alta humedad en el suelo y temperaturas entre 15 y 26 °C). En cultivos en sustrato o hidropónicos, o en parcelas con antecedentes de la enfermedad se podrán realizar tratamientos preventivos en época de riesgo a criterio del técnico responsable, basados en condiciones climáticas, del suelo o sustrato y del estado de desarrollo de la planta.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en el apartado:

**Agente:**

**“Podredumbre cuello y raíz: % Total plantas afectadas”.**

Se calcula como el número total de plantas afectadas por estos hongos, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Podred. cuello y raíz : \% Total plantas afectadas} = \frac{\text{N}^\circ \text{ total de plantas afectadas}}{\text{N}^\circ \text{ plantas observadas}} \times 100$$

#### 4.12- Chancro gomoso del tallo (*Didymella bryoniae*)

Está ampliamente extendido por todos los continentes, en especial en las zonas tropicales y subtropicales. En España se ha citado en Andalucía, Islas Canarias y Valencia.

La humedad y temperatura son determinantes en la presencia y extensión de la enfermedad. La temperatura mínima de crecimiento del hongo es de 5 °C y puede crecer a temperaturas superiores a 35 °C, con un óptimo alrededor de 23 a 25 °C. La humedad relativa a partir del 95 % es favorable para su desarrollo, sobretodo cuando hay presencia de agua libre sobre la planta.

El hongo se mantiene en el suelo y en los restos vegetales, durante más de un año. Es muy resistente a la sequía, lo que le permite mantenerse también sobre las estructuras de la protección. Las esporas pueden dispersarse por aire, salpicaduras de agua, mecánicamente, por insectos e incluso por semillas de frutos infectados. Las heridas de poda e injertos son los puntos más frecuentes de infección.

Los **síntomas** más característicos son los de "chancro gomoso del tallo" que se caracteriza por una lesión pardo claro en el tallo, recubierta de picnidios (puntos negros) y frecuentemente con exudaciones gomosas en los bordes de la lesión. También aparecen manchas foliares, de aspecto verde aceitoso que se oscurecen más tarde.



Podredumbre blanda en frutos de melón producida por *Didymella bryoniae*.



Tallo de melón con chancro seco y picnidios negros de *Didymella bryoniae*.

### ➤ Estimación del riesgo

- **Muestreo:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo, ya que las condiciones ambientales dentro del invernadero son más propicias para su desarrollo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. La detección de estas bacterias en la planta se realizará en las hojas, tallos o frutos, según sea el caso.

El **umbral de tratamiento** se supera cuando se observen plantas con síntomas de algunas de las mencionadas bacterias y se den las condiciones favorables para su desarrollo. En parcelas con antecedentes de haber padecido alguna de estas bacterias se podrán realizar tratamientos preventivos en época de riesgo a criterio del técnico responsable, basados en condiciones climáticas y estado de desarrollo de la planta.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en el siguiente apartado:

**Agente:**

**"*Didymella bryoniae*": % Total plantas afectadas"**

Se calcula como el número total de plantas afectadas por estos hongos, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Chancro gomoso del tallo : \% Total plantas afectadas} = \frac{\text{N}^\circ \text{ total de plantas afectadas}}{\text{N}^\circ \text{ plantas observadas}} \cdot 100$$

#### 4.13.- Cladosporiosis de las cucurbitáceas (*Cladosporium cucumerinum*)

Las temperaturas que favorecen el desarrollo de esta enfermedad van de 20 a 25 °C y una humedad relativa superior al 80 %. Su incidencia disminuye de forma muy importante al limitarse los períodos de humedad relativa alta.

El hongo puede sobrevivir en restos vegetales, en el suelo y sobre las estructuras del invernadero. Las conidias son viables de 9 a 12 meses. La propagación se realiza por el viento y la penetración en la planta es a través de los estomas.

Los **ataques** se manifiestan en el **haz** de las hojas en forma de manchas amarillas, angulares y contornos difuminados que se corresponden en el envés con un micelio de color pardo y violáceo. En caso de fuertes ataques el micelio puede alcanzar el haz de las hojas. Las hojas afectadas envejecen amarilleando y desecándose por completo. Los órganos que no tienen estomas como los frutos no son susceptibles, ya que el hongo no puede penetrar directamente. A continuación, se muestra la sintomatología sobre hojas de tomate.



Cladosporiosis, manchas cloritas en el haz



Manchas marrones de *Fulvia fulva* en el envés

#### ➤ Estimación del riesgo

- **Muestreo:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo, ya que las condiciones

ambientales dentro del invernadero son más propicias para su desarrollo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. La detección de la enfermedad en la planta es en las hojas.

El **umbral de tratamiento** se supera cuando se observen plantas con síntomas del hongo y se den las condiciones favorables para su desarrollo (H.R. > 80 % y Tª entre 20 y 25 °C). Hay que tener especial atención cuando la humedad ambiental sea elevada con ausencia de corriente de aire.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en el siguiente apartado:

**Agente:**

**"Cladosporiosis: % plantas afectadas".**

#### **4.14.- Bacteriosis**

Dos son las bacterias más comunes que producen bacteriosis en el cultivo del melón:

**Podredumbre blanda**, producida por *Erwinia carotovora subsp. carotovora*,

**Mancha angular de las cucurbitáceas**, producida por *Pseudomonas syringae pv. Lachrymans*.

- **Podredumbre blanda**

Las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad son altas humedades relativas y temperaturas entre 25 y 35 °C, siendo la óptima 22 °C.

Esta bacteria puede sobrevivir en el suelo, agua de riego, raíces de malas hierbas, material vegetal, etc. Suele penetrar por heridas en el cuello de las plantas o ser arrastrada por lluvia o viento a la parte aérea de la misma.

Se produce una podredumbre húmeda y blanda del tallo a distintos niveles. En el exterior se observan zonas negruzcas y húmedas, y en el interior la médula pasa de estar inicialmente parda hasta pudrirse, tomando un color oscuro, reblandeciéndose y desprendiendo un olor nauseabundo. En el fruto también puede aparecer podredumbre blanda en la inserción con el pedúnculo.

### ▪ **Mancha angular**

Esta enfermedad fue identificada por primera vez en EEUU y está muy extendida por las zonas de cultivo de cucurbitáceas. En España sólo ha sido identificada en Almería.

Las temperaturas y la humedad elevada parecen ser factores favorables para la enfermedad. La bacteria puede penetrar en las hojas a través de los estomas o heridas, por lo que su diseminación es fácil a través del agua de lluvia o riego.

En Almería la sintomatología provocada en melón presenta algunas diferencias con respecto al resto de cultivos. Por lo general se caracteriza por presentar estrías necróticas superficiales en la parte alta del tallo y zonas atabacadas en las hojas, que causan la marchitez de la planta.

### ➤ **Estimación del riesgo**

#### • **Muestreo:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo, ya que las condiciones ambientales dentro del invernadero son más propicias para su desarrollo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. La detección de estas bacterias en la planta se realizará en las hojas, tallos o frutos, según sea el caso.

El **umbral de tratamiento** se supera cuando se observen plantas con síntomas de algunas de las mencionadas bacterias y se den las condiciones favorables para su desarrollo. En parcelas con antecedentes de haber padecido alguna de estas bacterias se podrán realizar tratamientos preventivos en época de riesgo a criterio del técnico responsable, basados en condiciones climáticas y estado de desarrollo de la planta.

#### • **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en el apartado:

#### **Agente:**

**"Bacteriosis: % Total plantas afectadas"**

Se calcula como el número total de plantas afectadas por estas bacterias, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Bacteriosis : \% Total plantas afectadas} = \frac{\text{N}^\circ \text{ plantas afectadas}}{\text{N}^\circ \text{ plantas observadas}} \times 100$$

#### 4.15.- Virus del mosaico del pepino (CMV)

El CMV es un virus ampliamente difundido por todo el mundo especialmente en la zona templada. En España se ha identificado y citado en Valencia, Madrid, Aragón, Cataluña, Baleares, Murcia, Castilla León, Extremadura y Andalucía (Almería). Este virus posee una gran variedad de huéspedes. Tiene una alta variabilidad genética, lo que permite la aparición de nuevas cepas.

Este virus se contagia a través de los **pulgones**. Su transmisión la realizan los vectores de forma no persistente. El insecto adquiere el virus muy rápidamente al alimentarse de plantas enfermas, e inmediatamente es capaz de transmitirlo a plantas sanas, permaneciendo infectivo poco tiempo.

Las hojas presentan una superficie muy reducida (laciniado), que con frecuencia queda afectada por mosaico. Hay reducción del crecimiento y aborto de flores. El fruto presenta moteado. La producción se ve reducida.

##### ➤ Estimación del riesgo

- **Muestreo:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. La detección de este virus en la planta se realizará en las hojas, tallos o frutos, según sea el caso.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en el siguiente apartado:

**Agente:****“Virus mosaico del pepino: % plantas con síntomas”**

Se calcula como el número total de plantas con síntomas de este virus, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Virus mosaico del pepino : \% plantas con síntomas} = \frac{\text{N}^\circ \text{ plantas con síntomas}}{\text{N}^\circ \text{ plantas observadas}} \times 100$$

**4.16.- Virus del mosaico de la sandía-2 (WMV-2)**

Este virus tiene una distribución mundial. En España se ha citado en Valencia, Madrid, Aragón, Cataluña, Extremadura y Almería.

Ocasionalmente se da en leguminosas en las que produce mosaico y distorsión de frutos.

Este virus se **transmite** a través de los **pulgones**. Su transmisión la realizan los vectores de forma no persistente. El insecto adquiere el virus muy rápidamente al alimentarse de plantas enfermas, e inmediatamente es capaz de transmitirlo a plantas sanas, permaneciendo infectivo poco tiempo.



Deformación en fruto producida por el virus WMV - 2

Como **daños directos** en hojas, se observan mosaicos amarillos suaves, deformaciones, filimorfismo y abullonaduras. En fruto se observan igualmente cambios de color, mosaicos y deformaciones.

**➤ Estimación del riesgo****• Muestreos:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. La detección de este virus en la planta se realizará en las hojas, tallos o frutos, según sea el caso.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en el siguiente apartado:

**Agente:**

**“Virus mosaico de la sandía2: % plantas con síntomas”**

Se calcula como el número total de plantas con síntomas de este virus, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Virus mosaico del pepino : \% plantas con síntomas} = \frac{\text{N}^\circ \text{ plantas con síntomas}}{\text{N}^\circ \text{ plantas observadas}} \times 100$$

#### 4.17.- Virus del mosaico amarillo del calabacín (ZYMV)

Está extendido mundialmente. En España se ha citado en Andalucía, Murcia, Aragón, Cataluña y Madrid.

Este virus se transmite a través de los **pulgones**. La transmisión de este virus la realizan los vectores de forma no persistente. El insecto adquiere el virus muy rápidamente al alimentarse de plantas enfermas, e inmediatamente es capaz de transmitirlo a plantas sanas, permaneciendo infectivo poco tiempo.

Los **síntomas** en hojas consisten en la decoloración de las nerviaciones, amarilleamiento, mosaico con abullonaduras y filimorfismo. La planta presenta enanismo. En los frutos se observa deformación, reducción del crecimiento y alteración de la pulpa, así como deformación de las semillas.



Abullonaduras en hojas y mosaico en fruto de melón, respectivamente, producidos por el virus ZYMV.

## ➤ Estimación del riesgo

- **Muestreo:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. La detección de este virus en la planta se realizará en las hojas, tallos o frutos, según sea el caso.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en el siguiente apartado:

**Agente:**

**“Virus mosaico amarillo calabacín: % plantas con síntomas”**

Se calcula como el número total de plantas con síntomas de este virus, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Virus mosaico amarillo calabacín : \% plantas con síntomas} = \frac{\text{N}^\circ \text{ plantas con síntomas}}{\text{N}^\circ \text{ plantas observadas}} \times 100$$

### 4.18.- Virus del mosaico de la calabaza (SQMV)

Presenta una distribución mundial. En España se ha aislado en melón cultivado en invernadero en la zona de Almería.

Los **síntomas** que provoca dependen de la raza que afecte al cultivo. Varían desde la aparición de manchas verde oscuro junto a los nervios “**vein banding**” y filimorfismo de las rastras a un mosaico suave. Los frutos no manifiestan síntomas, si bien, hay una reducción en el número y un retraso en la maduración. En hojas se pueden producir deformaciones importantes o una recuperación aparente. La variedad **cantalupo** es particularmente sensibles y presenta mosaicos y deformaciones.



Vein-banding en hojas de melón producido por el virus SQMV.

### ➤ Estimación del riesgo

- **Muestreo:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. La detección de este virus en la planta se realizará en las hojas, tallos o frutos, según sea el caso.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en los siguientes apartados:

**Agente:**

**“Virus mosaico de la calabaza: % plantas con síntomas”**

Se calcula como el número total de plantas con síntomas de este virus, dividido entre el número total de plantas muestreadas u observadas, y todo ello multiplicado por 100.

$$\text{Virus mosaico amarillo calabaza : \% plantas con síntomas} = \frac{\text{N}^\circ \text{ plantas con síntomas}}{\text{N}^\circ \text{ plantas observadas}} \times 100$$

### 4.19.- Virus de las venas amarillas del pepino (CVYV)

El CVYV fue descrito por primera vez en 1960 en cucurbitáceas cultivadas en Israel. Desde el año 2001 afecta también a nuestra comunidad autónoma al identificarse en el poniente almeriense. Debido a esta reciente introducción, aún no se conoce muy bien el comportamiento de este virus en nuestros cultivos.

Este virus **se transmite** a través de la **mosca blanca del tabaco**. La transmisión se realiza exclusivamente por esta especie. Los adultos son los responsables de dicha transmisión, que en este caso se corresponde con la forma semi-persistente. Después de que el vector ha adquirido el virus, el periodo de latencia es sólo de 75 minutos. La mosca blanca retiene el virus durante 6 horas, en las que puede infectar otras plantas al alimentarse de ellas. Este virus también puede ser transmitido por inoculación mecánica, aunque de forma poco eficiente.

En las hojas del brote se observan los nervios de color amarillo, pudiendo presentarse de forma generalizada en toda la planta. Hay un menor desarrollo de la planta. En fruto no se observan síntomas.

### ➤ **Estimación del riesgo**

- **Muestreo:**

Los muestreos se realizarán durante todo el cultivo.

Las UMS se eligen de forma aleatoria, abarcando en lo posible todo el invernadero. La detección de este virus en la planta se realizará en las hojas, tallos o frutos, según sea el caso.

- **Parámetros:**

Las anotaciones sobre este agente se realizarán en el programa Triana-Cultivos en los siguientes apartados:

**Agente: "Virus venas amarillas pepino: % plantas con síntomas"**

**IMPORTANTE:** Los virus son parásitos obligados, por lo que no existen actualmente métodos curativos para su control, ya que cualquier producto que actuara contra el virus, también lo haría contra la propia planta. Por tanto, para poder realizar un control sobre las virosis es necesario actuar, sobre los vectores de transmisión.

La siguiente lista muestra otras posibles plagas, virus, hongos o bacterias que pueden afectar al melón:

- Araña roja (turkestani) (*Tetranychus turkestani*)

- Gusanos grises (segetum) (*Agrotis segetum*)
- Heliothis (peltigera) (*Heliothis peltigera*)
- Minador de hojas (strigata) (*Liriomyza strigata*)
- Minador de hojas (bryoniae) (*Liriomyza bryoniae*)
- Minador sudamericano de las hojas (*Liriomyza huidobrensis*)
- Mosca blanca de los invernaderos (*Trialeurodes vaporariorum*)
- Plusia (gamma) (*Autographa gamma*)
- Virus del cribado del melón (MNSV)
- Virus del enanismo amarillo del pepino (CYSDV)
- Alternaria de las cucurbitáceas (*Alternaria cucumerina*)
- Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)
- Podredumbre negra de raíz (*Chalara elegans*)
- Mancha bacteriana del fruto de la sandía (*Acidovorax avenae*)

#### 4.20.- Fauna auxiliar

En el cultivo del melón se pueden encontrar insectos auxiliares que controlan, en mayor o menor medida, las plagas más frecuentes halladas en él.

Entre los más importantes están:

**(Pulse sobre el nombre para obtener información detallada del insecto)**

[\*\*Eretmocerus mundus\*\*](#), parásito de moscas blancas.

[\*\*Nesidiocoris tenuis\*\*](#), depredador de moscas blancas.

[\*\*Aphidius colemani\*\*](#), parásito de pulgones.

[\*\*Phytoseiulus persimilis\*\*](#), depredador de ácaros tetraníquidos.

[\*\*Chrysopa sp.\*\*](#), depredador de pulgones.

[\*\*Diglyphus isaea\*\*](#), parásito de Minador de la hoja.

[\*\*Encarsia formosa\*\*](#), parásito de moscas blancas.

***Amblyseius swirskii***, depredador de ácaros tetraníquidos.

***Amblyseius cucumeris***, depredador de trips.

***Amblyseius californicus***, depredador de ácaros tetraníquidos.

**Anejo nº 3**  
**Instalación de trampas**

Las trampas se instalarán y se mantendrán durante toda la campaña según indica el **Reglamento Específico de Producción Integrada de Cultivos Hortícolas Protegidos (tomate, pimiento, berenjena, judía, calabacín, pepino, melón y sandía)** (Orden de 10 de octubre de 2007, publicado en BOJA 211 de 25 de octubre de 2007).

Se colocarán **placas cromotrópicas amarillas, placas cromotrópicas azules, trampas con feromonas.**

## 1.- Placas cromotrópicas amarillas

### ➤ Finalidad de la trampa

La finalidad de este tipo de trampa es doble, conocer el momento de entrada de **moscas blancas, pulgones** y **liriomyza** en la parcela, así como el control de estos insectos.



Trampa cromotrópica amarilla.

### ➤ N° de trampas

Según el reglamento de producción integrada de hortícolas no hay una cuantificación exacta en el número de unidades a instalar por invernadero, ni por extensión del mismo.

### ➤ Descripción de la trampa

Son unas tablillas de forma rectangular, por lo general, de material plástico y color amarillo, recubiertas de pegamento, dotadas de un orificio al cual se le inserta un alambre normalmente plastificado, para facilitar su colocación en algún soporte del invernadero.

Según su uso existen dos tipos, las de **monitoreo** y las de **control**.

Las primeras son utilizadas para medir las poblaciones de individuos de los

diferentes agentes que se pretende evaluar, están dotadas de unas bandas de papel entre 5-6 unidades, que se van desprendiendo una a una en cada periodo de observación (10-15 días), cuantificándose el número de insectos que se captura en ese periodo, una vez realizada esta operación se cubre la zona de la placa que ha capturado con la banda de papel y se descubre la banda siguiente y así sucesivamente hasta utilizar todas las bandas de la placa, desechándose la misma al hacer uso de todas las bandas.

Las de control están desprovistas de las bandas de papel, su cometido es el de capturar el mayor número posible de insectos, desechándose estas una vez se ha saturado la zona engomada con que cuenta la trampa.

➤ **Periodicidad del conteo**

Las trampas se deberán de visitar, cada 10 o 15 días dependiendo de la frecuencia con la que se realicen los muestreos y contabilizándose las capturas en aquellas trampas que su misión es el monitoreo.

➤ **Fecha de instalación de las trampas**

Las trampas de monitoreo se colocarán antes de implantar el cultivo y en los puntos críticos. Se mantendrán durante todo el ciclo del cultivo.

Las trampas de control se colocarán antes de implantar el cultivo con una densidad elevada.

Con la introducción del agente auxiliar *Nesidiocoris* sp. el número de estas últimas se limitará a los puntos críticos de la parcela.

➤ **Cálculo y expresión del índice de capturas**

Para determinar el índice de capturas (ATD: Adultos por Trampa y Día), en las trampas de monitoreo, se suma el número de individuos capturados en todas las trampas y se divide por el producto resultante entre el número de trampas y el número de días transcurridos desde la anterior observación o, en el caso de ser la primera observación a realizar, por el número de días transcurridos desde la instalación de las trampas. Es decir:

$$\text{A.T.D.} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de adultos capturados}}{\text{N}^\circ \text{ de trampas} * \text{N}^\circ \text{ días transcurridos}}$$

## 2.- Placas cromotrópicas azules

### ➤ Finalidad de la trampa

La finalidad de este tipo de trampa es conocer el momento de entrada de trips en la parcela, así como el control de estos insectos.



Trampa cromotrópica azul.

### ➤ N° de trampas

Se empleará una cantidad correspondiente a 100 feromonas/ha en placas azules.

### ➤ Descripción de la trampa

Son unas tablillas de forma rectangular por lo general de material plástico y color azul, recubiertas de pegamento, dotadas de un orificio al cual se le inserta un alambre por lo general plastificado, para facilitar su colocación en algún soporte del invernadero.

Según su uso existen **dos tipos**, las de monitoreo y las de control.

Las primeras son utilizadas para medir las poblaciones de individuos del agente que se pretende evaluar, están dotadas de unas bandas de papel entre 5-6 unidades, que se van desprendiendo una a una en cada periodo de observación (10-15 días), cuantificándose el número de insectos que se captura en ese periodo, una vez realizada esta operación se cubre la zona de la placa que ha capturado con la banda de papel y se descubre la banda siguiente y así sucesivamente hasta utilizar todas las bandas de la placa, desechándose la misma al hacer uso de todas las bandas.

Las de control están desprovistas de las bandas de papel, su cometido es el de capturar el mayor número posible de insectos, desechándose estas una vez se ha saturado la zona engomada con que cuenta la trampa.

➤ **Colocación de la trampa**

Las trampas se colgarán a 30-50 cm por encima del cultivo, pegando el emisor en la parte central de la placa.

Se colocarán al tresbolillo dejando entre 8-10 m entre ellas y 5 m a partir de la banda.

➤ **Periodicidad del conteo**

Las trampas se deberán de visitar, cada 10 o 15 días dependiendo de la frecuencia con la que se realicen los muestreos y contabilizándose las capturas en aquellas trampas que su misión es el monitoreo.

➤ **Fecha de instalación de las trampas**

Las trampas de monitoreo se colocarán antes de implantar el cultivo y en los puntos críticos. Se mantendrán durante todo el ciclo del cultivo.

Las trampas de control se colocarán antes de implantar el cultivo con una densidad elevada.

Con la introducción del agente auxiliar *Nesidiocoris* spp. el número de estas últimas se limitará a los puntos críticos de la parcela.

➤ **Cálculo y expresión del índice de capturas**

Para determinar el índice de capturas (ATD: Adultos por Trampa y Día), en las trampas de monitoreo, se suma el número de individuos capturados en todas las trampas y se divide por el producto resultante entre el número de trampas y el número de días transcurridos desde la anterior observación o, en el caso de ser la primera observación a realizar, por el número de días transcurridos desde la instalación de las trampas. Es decir:

$$\text{A.T.D.} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de adultos capturados}}{\text{N}^\circ \text{ de trampas} * \text{N}^\circ \text{ días transcurridos}}$$

### 3.- Trampas con feromonas

#### 3. 1- Orugas

➤ **Finalidad de la trampa**

La finalidad de este tipo de trampa es conocer el momento de entrada de lepidópteros (helióthis, plusia, rosquilla negra y rosquilla verde) en la parcela, así como el control de estos insectos.



Trampa cromotrópica amarilla con feromona.

➤ **Nº de trampas**

Se empleará una cantidad entre 3-5 trampas/ha y rodeadas de trampas adhesivas azules.

➤ **Descripción de la trampa**

Son unas tablillas de forma rectangular por lo general de material plástico y color amarillo, dotadas de un orificio al cual se le inserta un alambre normalmente plastificado, añadiéndose una ficha con atrayente sexual.

➤ **Colocación de la trampa**

Se colocarán tanto en el interior del invernadero o en los márgenes de la parcela.

#### 3. 2- Trips

➤ **Finalidad de la trampa**

La finalidad de este tipo de trampa es mejorar la sensibilidad de las placas de monitoreo para trips (*Frankliniella occidentalis*), particularmente en condiciones de niveles bajos de infestación en la parcela.



Trampa cromotrópica azul con feromona específica para trips.

➤ **Nº de trampas**

Se empleará una dosis de 100 feromonas/ha en placas azules.

➤ **Colocación de la trampa**

Las placas se cuelgan a 30-50 cm por encima del cultivo pegando el emisor en la parte central de la placa. Colocarlas a tresbolillo dejando 8-10 m entre ellas y 5 m a partir de la banda.

**Anejo nº 4**  
**Variables de la aplicación Triana a cumplimentar en**  
**la RAIF**

AGENTE	PARÁMETRO A OBSERVAR
<b>Araña roja (<i>Tetranychus spp</i>)</b>	Araña roja: % plantas con presencia
	<i>Amblyseius californicus</i> : %plantas con presencia
	<i>Amblyseius swirskii</i> : %plantas con presencia
	<i>Phytoseiulus persimilis</i> : %plantas con presencia
<b>Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>, <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)</b>	M. blanca: % plantas con presencia
	Amarilleamientos virales: %plantas con síntomas
	Virus de las venas amarillas del pepino: %plantas con síntomas
	<i>Amblyseius swirskii</i> : % plantas con presencia
	<i>Encarsia formosa</i> : % plantas con presencia
	<i>Macrolophus caliginosu</i> : % plantas con presencia
	<i>Eretmocerus eremicus</i> : % plantas con presencia
	<i>Eretmocerus mundus</i> : % plantas con presencia".
<b>Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>, <i>Myzus persicae</i>, <i>Aphis craccivora</i>)</b>	Pulgón: % plantas con presencia
	Momias: % plantas con presencia
	Virus mosaico del pepino: % plantas con síntomas
	Virus mosaico amarillo del calabacín: %plantas con síntomas
	Virus mosaico de la sandía2: % plantas con síntomas
	Amarilleamientos virales: % plantas con síntomas
	<i>Adalia bipuntata</i> : % plantas con presencia".
	<i>Aphidius colemani</i> : %plantas con presencia
	<i>Aphidoletes aphidimyza</i> : %plantas con presencia
	<i>Chrysoperla carnea</i> : %plantas con presencia
	<i>Lysiphlebus testaceipes</i> : %plantas con presencia
<b>Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)</b>	<i>F. occidentalis</i> :% plantas con presencia
	<i>F. occidentalis</i> :% frutos con daños
	<i>Amblyseius swirskii</i> : %plantas con presencia
	<i>Amblyseius cucumeris</i> : %plantas con presencia
<b>Orugas (<i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Heliiothis peltigera</i>, <i>Chrysodeixis chalcites</i>, <i>Autographa gamma</i>, <i>Spodoptera littoralis</i>, <i>Spodoptera exigua</i>, <i>Trichoplusia ni</i>)</b>	Orugas: % plantas con larvas o daños recientes
	Orugas: % frutos con daños
	<i>Steinernema carpocapsae</i> : %plantas con presencia
<b>Liriomyza (<i>Liriomyza trifolii</i>, <i>L. strigata</i>, <i>L. bryoniae</i>, <i>L. huidobrensis</i>)</b>	Minador: % plantas con larvas vivas
	<i>Diglyphus isaea</i> : % plantas con presencia
<b>Nemátodos (<i>Meloidogyne javanica</i>, <i>Meloidogyne arenaria</i>)</b>	Nemátodos: % plantas con presencia
<b>Podredumbre de cuello y raíces (<i>Phytophthora sp</i>, <i>Pythium sp</i>, <i>Rhizoctonia sp</i>, <i>Chalara elegans</i>)</b>	Podred cuello y raíz:% Total plantas afectadas

<b>Cladosporiosis de las cucurbitáceas (<i>Cladosporium cucumerinum</i>)</b>	Cladosporiosis:% plantas afectadas
<b>Oidio de las cucurbitáceas (<i>Sphaeroteca fuliginea</i>)</b>	Oidio de las cucurbitáceas:% plantas afectadas
<b>Podredumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i>)</b>	Podredumbre gris : % plantas con presencia
<b>Podredumbre blanca (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)</b>	Podredumbre blanca : % plantas con presencia
<b>Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)</b>	Mildiu de las cucurbitáceas:% plantas presencia
<b>Chancro gomoso del tallo (<i>Didymella bryoniae</i>)</b>	Chancro gomoso del tallo: % plantas afectadas
<b>Bacteriosis (<i>Erwinia carotovora subsp. carotovora, Pseudomonas syringae</i>)</b>	Bacteriosis: % Total plantas afectadas
<b>Fusariosis vascular (<i>Fusarium oxysporum f. Sp. melonis</i>)</b>	Fusariosis vascular: %Plantas afectadas
<b>CMV (Cucumber Mosaic Virus)</b>	Virus del mosaico pepino:% plantas con síntom
<b>ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic Virus)</b>	V.mosaico amari. calabacín:% plantas con síntomas
<b>WMV-2 (Watermelon Mosaic virus-2)</b>	V.mosaico sandía2:% plantas con síntomas
<b>AMARILLEAMIENTOS VIRALES</b>	Amarilleamientos virales: %plantas con síntomas"
<b>SqMV (Squash Mosaic Virus)</b>	V.mosaico calabaza:% plantas con síntomas
<b>CVYV (Cucumber Vein Yellowing Virus)</b>	V.venas amarillas pepino:% plantas con sínto
<b>CABYV (Virus del amarilleo de las cucurbitáceas)</b>	Virus del amarilleo de las cucurbitáceas: % plantas con síntomas.
<b>MNSV (Melon Necrotic Spot Virus)</b>	Virus del cribado del melón: % plantas con síntomas.

**Anejo nº 5**  
**Información contenida en la página web de la RAIF**

## Información contenida en la página web de la RAIF

Tal y como se ha comentado en el documento principal al que pertenece este anejo, la dirección para entrar en la página web de la RAIF es la siguiente:

<https://www.juntadeandalucia.es/agriculturapescaydesarrollorural/raif>

De este modo, al acceder a dicha dirección aparece la siguiente pantalla:


The screenshot shows the RAIF website homepage. At the top, there is a header with the logo of the Junta de Andalucía and the text 'CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE'. Below the header, there is a navigation menu with categories like 'Inicio', 'Plagas Destacadas', 'Normativa', and 'Viveo RAIF'. The main content area includes a 'Actualidad fitosanitaria' section with a featured article about the importance of valuing the presence of the hairy caterpillar in vineyards. There are also sections for 'Noticias' with two news items, 'Información destacada' with two featured articles, and a 'Enlaces de interés de Sanidad vegetal' section at the bottom with four links.

Imagen 1: Pantalla de inicio de la página web de la RAIF

La pantalla está dividida en apartados, desde donde se puede acceder:

- Información de los cultivos (documental o gráfica), Producción Integrada (normativa, sustancias autorizadas).
- Noticias.
- Acceso al visor gráfico.
- Eventos, en donde a partir de un calendario se encuentran marcados los días de celebración de diferentes acontecimientos de interés.
- Actualidad Fitosanitaria, edición de artículos en donde se informa al usuario de la información más destacable relacionada con los cultivos que cubre la RAIF.
- Galería de imágenes.
- Enlaces de interés de Sanidad Vegetal.
- Otros accesos de interés, como Uso sostenible de productos fitosanitarios, mis alertas, delimitación de zonas biológicas, información agroclimática, webs de interés y un buzón de consulta.
- Seguimiento de la RAIF, a través de Facebook, Youtube, formato móvil y canales RSS.

- **Información documental y gráfica**



**Imagen 2: Acceso a la información**

Para ello, se posicionará el cursor del ratón sobre el icono elegido y pulsando sobre el mismo, accederemos a la información documental “**Boletín provincial**” o gráfica “**Visor RAIF**”.

- **Boletín provincial**



The screenshot shows the RAIF website interface. The header includes the logo 'RAIF' and the text 'RED DE ALERTA E INFORMACIÓN FITOSANITARIA DE ANDALUCÍA'. The main navigation menu is organized into four columns:

- Column 1: Inicio, Financiación RAIF, ¿Qué es la RAIF?, Boletín Autonómico, **Boletín Provincial** (highlighted), Gráficas.
- Column 2: Plagas Destacadas, Sust. Autorizadas en P. Integrada, Uso Sostenible Productos Fitosanitarios, Manuales de Campo.
- Column 3: Normativa, Webs de Interés, Delimitación por Zonas Biológicas, Eventos, Revista Digital RAIF.
- Column 4: RAIF App, Visor RAIF, Mis Alertas, Fichas Fitopatológicas, Histórico de publicaciones.

On the right side, there is a section titled '¿Te podemos ayudar?' with social media icons and a search bar. Below the navigation menu, the URL 'www.juntadeandalucia.es/agriculturapescajd... / Boletín Provincial' is visible. The main content area contains the following text:

La información se ha estructurado de manera que el usuario pueda consultarla a varios niveles:

- **Informes históricos**, permite conocer el estado fitosanitario de los cultivos en años anteriores por semanas.
- **Balances anuales**, permite acceder a los distintos resúmenes fin de campaña de cada provincia.
- **Informes provinciales**, de forma más detallada se informa de los aspectos fitosanitarios más relevantes ocurridos en el transcurso de la semana en cada una de las provincias andaluzas.

Below this list, there is a sub-menu with three items: 'Informes históricos', 'Balances anuales', and 'Informes semanales'. A green arrow points to the 'Informes históricos' link.

**Imagen 3: Informes fitosanitarios**

Al elegir la opción **Boletín provincial** aparece la pantalla tal y como podemos observar en la imagen 3, con la posibilidad de acceder a diferentes tipos de informes (semanales e históricos) y balances anuales.

- **Balances anuales**

The screenshot shows the RAIF website interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Inicio', 'Financiación RAIF', '¿Qué es la RAIF?', 'Boletín Autonómico', 'Boletín Provincial', and 'Gráficas'. The main content area is titled 'Balances Anuales' and includes a subcategory list for each year from 2008 to 2019. The subcategories are: almería, cádiz, cordoba, granada, huelva, Más ».

**Imagen 4: Balances anuales**

Pulsando el icono “**Balances anuales**”, accedemos a una ventana en donde se puede seleccionar las diferentes campañas.

Una vez elegida la campaña, nos encontramos con la relación de provincias de la comunidad autónoma, elegimos la provincia de la cual nos interesa conocer el estado fitosanitario y nos da acceso a la relación de cultivos en seguimiento con los que cuenta esa provincia.

- **Informes provinciales**

The screenshot shows the RAIF website interface. At the top, it features the logo of the Junta de Andalucía and the text 'CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE'. Below this is the title 'RAIF | RED DE ALERTA E INFORMACIÓN FITOSANITARIA DE ANDALUCÍA'. The main navigation menu includes: Inicio, Financiación RAIF, ¿Qué es la RAIF?, Boletín Autonómico, Boletín Provincial (highlighted), Gráficas, Plagas Destacadas, Sust. Autorizadas en P. Integrada, Uso Sostenible Productos Fitosanitarios, Manuales de Campo, Normativa, Webs de Interés, Delimitación por Zonas Biológicas, Eventos, Revista Digital RAIF, RAIF App, Visor RAIF, Mis Alertas, Fichas Fitopatológicas, and Histórico de publicaciones. On the right, there is a search bar and social media links. Below the navigation, a text block explains the purpose of the provincial report: 'El Informe provincial tiene la finalidad de dar a conocer la situación fitosanitaria de la provincia. En el se expone semanalmente la situación e incidencia de las plagas y enfermedades, el estado fenológico, las prácticas realizadas, información meteorológica y las recomendaciones para facilitar el buen estado fitosanitario de los diferentes cultivos de la provincia. El usuario puede acceder además a la información del cultivo que más le interese, con información puntual sobre los aspectos principales del cultivo.' Below the text is a map of Andalusian provinces: HUELVA, SEVILLA, CÁDIZ, MÁLAGA, CÓRDOBA, GRANADA, JAÉN, and ALMERÍA. At the bottom of the map, the text reads: 'Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla'.

**Imagen 5: Informes provinciales**

Pulsando el icono "**Informes semanales**", nos aparece la imagen 5, en donde se representa el mapa de la comunidad autónoma andaluza con la delimitación de cada una de las provincias. Pulsando sobre la silueta de la provincia elegida, surge una nueva imagen en donde figura una relación con los cultivos que se realiza su seguimiento, así como un apartado denominado "**Provincial**" en donde se unifican todos los informes de esa provincia.

Una vez seleccionado el cultivo, accedemos al documento en donde se sintetiza y compara la evolución de los diferentes agentes entre las diferentes zonas biológicas.


- **Informes históricos**

The screenshot shows the RAIF website interface. At the top, there is a navigation menu with categories like 'Inicio', 'Plagas Destacadas', 'Normativa', and 'RAIF App'. Below this, there is a section titled '¿Te podemos ayudar?' with social media icons and a search bar. The main content area is titled 'Informes Históricos' and includes a sub-header 'Subcarpetas'. Below the sub-header, there is a list of historical reports from 2006 to 2020, each with a folder icon. The list is paginated, showing 'Página 1 de 1' and 'Mostrando 15 resultados'.

**Imagen 6: Informes históricos**


Pulsando el icono “**Informes históricos**”, nos da acceso a la información de campañas anteriores. Esta ventana cuenta con tantos iconos como años de seguimiento se han venido realizando. Pulsando en cada uno de estos iconos podemos seleccionar cualquier provincia de la comunidad autónoma andaluza, una vez seleccionada la provincia nos aparece la posibilidad mediante una pestaña desplegable podemos seleccionar por semanas el informe fitosanitario.

• **Visor RAIF**



**Imagen 7: Acceso al visor RAIF**

Para acceder a la información gráfica, pulsamos sobre el icono “**Visor RAIF**”, generándose una nueva ventana que se encuentra dividida en tres partes.



**Imagen 8: Visor RAIF**

Un panel izquierdo, en donde podemos seleccionar diferentes tipos de cultivos,

plagas, variables, fechas, etc.

Por defecto el resultado gráfico de las variables seleccionadas nos muestra la representación en todas las provincias de la comunidad autónoma que se lleva el seguimiento del cultivo seleccionado. Si lo que pretendemos es centrar nuestra búsqueda en una provincia determinada, tendremos que seleccionarla previamente.

Otra opción que se facilita en este panel izquierdo es la posibilidad de localizar ciertos parajes y ubicarlos en el mapa, para ello en la parte inferior se dispone de la pestaña  de introduciremos el nombre del paraje.

Otra parte, la central, en donde podemos ver gráficamente el resultado de las diferentes variables seleccionadas en el panel izquierdo.

En la parte inferior, se encuentra la escala de la imagen editada y las coordenadas UTM – X e Y en la proyección UTM 30N ETRS89, de la situación en que se encuentra el cursor del ratón en cada momento.

En esta parte central, se cuenta con una serie de iconos situados en la parte superior, a modo de herramientas, en donde podemos realizar diferentes acciones como:



- Zoom a la máxima extensión.



- Navegar; permite desplazar la imagen.



- Acercar, alejar; permite hacer zoom sobre la imagen.



- Anterior, siguiente; permite cambiar a las imágenes editadas anteriormente.



- Medir distancias; permite conocer la distancia entre puntos señalados en el mapa editado.



- Medir superficies; permite conocer la superficie englobada entre una serie de puntos señalados en el mapa editado.



- Muestra información de cualquier punto que seleccionamos en el mapa editado.



- Localización de parcelas por provincia, municipio, polígono, parcela y recinto.



- Informes; da acceso a los informes del periodo seleccionado.



- Animación de estados fitosanitarios; permite seleccionar plaga, variable, periodo de tiempo y provincia.



- Muestra la leyenda de la capa activa.



- Acceso al manual de usuario del Visor RAIF.



- Información Fitosanitaria por cultivos y agentes.

Y una tercera parte, el panel derecho, en donde se recoge la información de las gráficas editadas.


El visor gráfico tiene la particularidad de ir acumulando las graficas que se van editando y tenerlas disponibles en cualquier momento, contando con la posibilidad de solaparlas entre si.

Para acceder a la información biológica de cada agente, pulsaremos sobre el icono,



que viene situado en la parte central del visor.

Una vez pulsado este icono, nos aparecerá una nueva ventana en donde se elegirá el cultivo y una vez seleccionada la plaga, surgirá en el margen derecho de la misma, un icono con la imagen de la plaga; para acceder a la información relacionada con ella, pulsaremos sobre dicha imagen, lo que facilitará el acceso a su información biológica.



**Imagen 9: Acceso a la información biológica de los agentes por cultivos**

Como se puede ver en la imagen 9, se detalla una serie de opciones con información relativa al agente elegido, pulsando en cada una de estas opciones se tiene acceso a una información extensa de las particularidades del agente.

Otra forma de editar la información obtenida de los muestreos de campo es mediante la representación de gráficas de evolución, a continuación, se puede ver un ejemplo de ellas.

- **Gráficas provinciales**



**Imagen 10: Acceso a gráficas provinciales**

Desde la página de inicio y tal como se puede ver en la imagen 10, accedemos a la opción de gráficas provinciales, estas gráficas nos muestran la evolución en el tiempo de las distintas plagas y enfermedades. Pulsando sobre la pestaña "Gráficas", nos aparece todas las provincias que componen la comunidad autónoma, seleccionando cualquiera de las siluetas de las diferentes provincias nos permite visualizar los cultivos que se realiza el seguimiento en esa provincia.




Imagen 11: Gráficas e informes

Al seleccionar el cultivo accedemos a una nueva pantalla en donde podemos elegir aquellos agentes de los que se editan gráficas, así mismo, tenemos la opción de editar un informe con el resumen de presencia de las diferentes plagas que afectan al cultivo seleccionado.




Imagen 12: Gráfica