

Carbonero común

Parus major (Linnaeus, 1758)

NA

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Identificación:

Muy parecidos los dos sexos, el mayor de los páridos que hay en España, partes inferiores amarillo intenso con una franja negra desde la garganta hasta la cola, en el macho esta franja es más ancha, partes superiores verdosas, cabeza y nuca negras, con grandes manchas blancas en las mejillas, alas azuladas con mancha alar blanca. Pico negro corto y robusto.

Especies parecidas:

Quizás con en Herrerillo común, aunque éste es mucho más pequeño y no tiene casi nada de negro.

Hábitat:

Desde el nivel del mar hasta los 1.600 metros y los 2.100 m. de Sierra Nevada. Ocupa todo tipo de arbolados, dehesas, huertos frutales, jardines, etcétera.

Comportamiento:

En el sitio mas insospechado cría, huecos de árboles, en cualquier agujero o grieta de paredes, ocupa sin dificultad nidos artificiales y se aprovecha para alimentarse de desperdicios dejados por el hombre en parques y jardines.

Distribución:

Paleártica. Cría en toda Europa y

gran parte de Asia hasta China y Japón. En España y Baleares nidifica la especie nominal *P. m. alanorum*. En el parque, ocupa zonas de pinos y árboles junto al río.

Fenología:

Sedentario. Esta especie esta aumentando sus efectivos en el parque debido a la colocación de cajas nido en el mismo. Con anterioridad a la colocación de estos nidales artificiales el Carbonero común podría calificarse en el interior del parque como casi una especie accidental.

	Abundante	ESTATUS
	Abundante	
	Escaso	
	14 cm.	TAMANO
	22,5-25,5 cm.	
	15-21 g.	

