

Curruca capirotada

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

NA

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Identificación:

Curruca grande con el cuerpo grisáceo con las alas marronáceas y el pileo negro en los machos y marrón rojizo en las hembras y los jóvenes, siempre por encima del ojo. Los jóvenes adquieren el color de adultos después de la muda postnupcial, por lo que los invernantes ya llegan con el color definitivo.

Especies parecidas:

Curruca mirlona, curruca cabecinegra y curruca mosquitera.

Hábitat:

Matorral, frutales y setos, si bien se puede observar en todos los tipos de vegetación del parque.

Comportamiento:

Comportamiento huidizo, lo que hace que a pesar de su abundancia, sus observaciones no sean numerosas. Se mueve rápidamente entre el matorral alimentándose de los frutos, principalmente de los del lentisco y acebuche.

Distribución:

Europea, si bien nidifica también en el Magreb y la macaronesia. En el parque se puede observar en todo el recinto, si bien es mu-

cho más abundante en las zonas con matorral.

Fenología:

Especie invernante, los primeros visitantes llegan al parque durante la segunda quincena de septiembre, permaneciendo en él hasta la segunda quincena de abril. Tres aves de esta especie capturadas para el anillamiento eran de origen belga, y una cuarta era de origen alemán. Alguna pareja aislada se queda en el parque para nidificar, siendo un nidificante muy escaso pero regular.

 Abundante	ESTATUS
 Abundante	
 Abundante	
 14 cm.	TAMANO
 20-23 cm.	
 14-24 g.	

