

**INFORME SOBRE LA ENCUESTA
ESCOLAR SOBRE USO DE DROGAS EN
ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA (ESTUDES).
ANDALUCÍA. 2006-2007**



Índice

1. Introducción	3
2. Metodología	4
2.1. Diseño muestral	4
2.2. Cuestionario y análisis de datos	5
3. Resultados	7
3.1. Evolución del consumo de drogas.....	7
3.2. Edad media de inicio en el consumo	9
3.3. Diferencias en el consumo de drogas según género	11
3.4. Diferencias en el consumo por edad	13
3.5. Consumo de tabaco.....	15
3.6. Consumo de bebidas alcohólicas	16
3.7. Consumo de tranquilizantes y somníferos.....	20
3.8. Consumo de cannabis.....	21
3.9. Consumo de cocaína	23
3.10. Consumo de éxtasis	24
3.11. Consumo de anfetaminas	25
3.12. Consumo de alucinógenos.....	26
3.13. Consumo de heroína	26
3.14. Consumo de inhalables volátiles.....	27
3.15. Policonsumo de sustancias psicoactivas.....	28
3.16. Riesgo percibido ante el consumo de drogas	30
3.17. Disponibilidad de drogas percibida por los entrevistados.....	33
3.18. Información recibida sobre drogas.....	35
4. PRINCIPALES RESULTADOS	37



1. Introducción

El informe que se presenta a continuación tiene por objetivo recoger los resultados obtenidos en la Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, realizada en el curso 2006-2007. Este estudio se lleva a cabo a partir de los datos aportados por el Proyecto Español de Encuestas sobre Drogas a la Población Escolar que, desde 1994 y de manera bienal, viene realizando el Plan Nacional sobre Drogas. De esta forma, algunos de los resultados extraídos pueden ser comparados con los obtenidos en años anteriores.

La encuesta se dirige a estudiantes de 14 a 18 años que cursan Enseñanzas Secundarias.

El estudio es de carácter descriptivo y en él se incluyen indicadores epidemiológicos, sociodemográficos, sobre patrones de conductas relacionadas con el consumo, de opinión y de actitudes hacia el fenómeno de las drogas.

El informe se ha estructurado en bloques sobre el consumo de las diversas sustancias psicoactivas. Dentro de cada uno de estos bloques se analizan los datos de prevalencia, patrones de consumo y perfil de los consumidores de cada una de las sustancias estudiadas.

Se analizan también datos sobre policonsumo en esta población de estudio y sobre el riesgo percibido hacia diversas conductas relacionadas con el consumo de sustancias, la disponibilidad de las mismas y el grado de información sobre drogas que el alumnado considera que tiene.



2. Metodología

2.1. Diseño muestral

La población de referencia utilizada para la encuesta es el conjunto de escolares de secundaria en Andalucía con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. Los centros en los que se aplicó la encuesta fueron de carácter público y privado, ya fueran concertados o no, y los escolares podían pertenecer a alguno de los siguientes cursos:

- 3º de E.S.O.
- 4º de E.S.O.
- 1º Bachiller LOGSE
- 2º Bachiller LOGSE
- Ciclos Formativos de Grado Medio.

Se utilizó un muestreo polietápico por conglomerados, seleccionando aleatoriamente colegios como unidades de primera etapa y aulas como unidades de segunda etapa. Posteriormente fueron incluidos en la muestra todos los estudiantes de las aulas seleccionadas.

El diseño de la muestra, realizado desde el Plan Nacional sobre Drogas, garantiza la representatividad de cada una de las Comunidades Autónomas. Así, los resultados que se extraen para la Comunidad Autónoma Andaluza son representativos.

Otra de las variables que fue considerada en el muestreo fue el tipo de centro en el que se llevó a cabo: público o privado. La edad y el curso de los escolares no fueron considerados como criterios de estratificación en la fase de muestreo.

El muestreo se realizó a partir del listado de centros facilitado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

La muestra final estuvo constituida por un total de 2.750 entrevistas realizadas en 70 centros: 1.498 encuestas pertenecientes a centros públicos y

1.252 a centros privados. Su distribución según el nivel educativo al que pertenecen los escolares se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Descripción de la muestra

	NÚMERO	PORCENTAJE
TITULARIAD DEL COLEGIO		
Público	1498	54,5
Privado	1252	45,5
TIPO DE ESTUDIOS		
ESO	1339	48,7
Bachillerato	1005	36,5
F. Profesional/Ciclos formativos	406	14,8
GENERO		
Chicos	1208	43,9
Chicas	1542	56,1
EDAD		
14 años	513	18,7
15 años	529	19,2
16 años	693	25,2
17 años	660	24,0
18 años	335	12,9
PROVINCIA		
Almería	222	8,1
Cádiz	396	14,4
Córdoba	333	12,1
Granada	431	15,7
Huelva	217	7,9
Jaén	215	7,8
Málaga	379	13,8
Sevilla	557	20,3
Nº TOTAL DE ENTREVISTAS	2.750	100%

2.2. Cuestionario y análisis de datos

Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario anónimo, autoadministrado en sesiones colectivas en el aula.

Para mantener la comparabilidad con años anteriores se han mantenido los bloques correspondientes a las prevalencias generales de consumo de sustancias, percepción del riesgo y disponibilidad de sustancias. Por otro lado, se introdujeron algunas preguntas nuevas para profundizar en aspectos concretos y pautas de consumo novedosas, como el *binge drinking* o *atracones de alcohol*.

El cuestionario recoge información sobre los siguientes bloques: características sociodemográficas, consumo de drogas, percepción de riesgo sobre

distintas drogas psicoactivas, problemas sociales o de salud derivados del consumo, información y prevención sobre drogas, consumo de drogas en el entorno de los amigos y compañeros y actitud de los padres con respecto al consumo de drogas.

Se ha realizado un análisis descriptivo de frecuencias y porcentajes y medidas de tendencia central cuando el tipo de variable analizada lo permite. Contamos con datos analizados para Andalucía correspondientes al año 2002, por lo que es posible ofrecer tablas comparativas con los resultados de cada año, que nos dan una idea de la evolución de los consumos en la población escolar andaluza.



3. Resultados

3.1. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

El **alcohol** es la sustancia más consumida entre los estudiantes de secundaria de 14 a 18 años. Su uso se ha incrementado con respecto a 2002, tanto en la prueba como el consumo en el último año y el actual –último mes-. El 78% de estos jóvenes ha tomado en alguna ocasión alguna bebida alcohólica y el 54,8% lo ha hecho en el último mes.

El **tabaco** es la segunda sustancia con prevalencias de consumo más elevadas. Respecto a 2002 se ha reducido el porcentaje de estudiantes de estas edades que ha fumado alguna vez, pasando de 56,8% a un 44,7%. Sin embargo su consumo durante el último año y el último mes se encuentra estabilizado. El 27,2% del alumnado de secundaria ha fumado en el último mes.

Entre las sustancias ilegales, el **cannabis** se encuentra notablemente más extendido que el resto: el 30,2% de los estudiantes lo ha consumido alguna vez y el porcentaje de consumidores actuales (es decir, que han consumido en el último mes) es del 15,7%. Este consumo se encuentra estable con respecto a las prevalencias detectadas en 2002.

Las prevalencias de consumo de **hipnosedantes** sin receta médica alguna vez en la vida y en el último año se han incrementado en Andalucía en estos cuatro años. Sin embargo, el consumo actual de estas sustancias permanece estable. En 2006, el 2,4% del alumnado afirma haber tomado hipnosedantes sin receta médica en el último mes.

El consumo de **cocaína** desciende en 2006 entre el alumnado de secundaria. Se reduce el porcentaje de alumnos que han consumido cocaína alguna vez, en el último año y también el de consumidores actuales. También desciende el consumo de **éxtasis** alguna vez en la vida y en el último año, si bien el consumo de esta sustancia en el último mes se encuentra en niveles prácticamente iguales a los de 2002.

En Andalucía, al igual que en el conjunto del país¹, se detecta en 2006 un cierto incremento del consumo de **heroína**. Se trata de un incremento muy reducido, que será preciso confirmar en las próximas ediciones de este estudio, ya que también podría deberse a variaciones porcentuales propias del trabajo con muestras poblaciones.

Otros indicadores de consumo de sustancias en Andalucía, como son el Indicador de Admisiones a Tratamiento² y la encuesta poblacional "La Población Andaluza ante las Drogas"³ detectan también en 2007 leves incrementos del consumo de heroína. Pese a que en todos los casos se trata de aumentos porcentuales muy reducidos, el hecho de que se hayan detectado a través de tres indicadores diferentes, es un motivo para permanecer alerta con respecto a la evolución del consumo de esta sustancia en los próximos años.

¹ Informe de la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2006-2007. Ministerio de Sanidad y Consumo, Secretaría General de Sanidad, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

² Informe del Indicador Tratamiento 2007. Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones.

³ La Población Andaluza ante las Drogas, 2007. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía.

Tabla 2. Evolución de las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (Porcentajes).

	2002	2006
Prevalencia de Consumo alguna vez en la vida		
Alcohol	72,8%	78,0%
Tabaco	56,8%	44,7%
Cannabis	29,1%	30,2%
Hipnosedantes*	6,5%	8,3%
Cocaína	5,3%	5,0%
Alucinógenos	3,1%	3,6%
Éxtasis	4,5%	3,3%
I. Volátiles	2,7%	2,6%
Anfetaminas	2,9%	2,4%
Heroína	0,4%	0,9%
Prevalencia de Consumo en los últimos 12 meses		
Alcohol	71,7%	72,6%
Tabaco	---	32,9%
Cannabis	24,8%	24,3%
Hipnosedantes*	4,2%	5,3%
Cocaína	4,2%	3,3%
Éxtasis	3,0%	2,5%
Alucinógenos	2,1%	2,4%
Anfetaminas	2,1%	1,9%
I. Volátiles	2,1%	1,5%
Heroína	0,2%	0,7%
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días		
Alcohol	52,7%	54,8%
Tabaco	27,2%	27,2%
Cannabis	15,7%	15,7%
Hipnosedantes*	2,7%	2,4%
Cocaína	2,5%	1,8%
Éxtasis	1,0%	1,3%
I. Volátiles	0,8%	1,1%
Alucinógenos	1,1%	0,9%
Anfetaminas	0,9%	0,9%
Heroína	0,2%	0,4%

*Sin receta médica

3.2. EDAD MEDIA DE INICIO EN EL CONSUMO

Entre el alumnado que ha consumido las diversas sustancias alguna vez en la vida, se han analizado las edades medias a las que se produjo el primer consumo de cada droga.

Las sustancias que se prueban de manera más precoz son el tabaco (como media, se consume por primera vez a los 13,2 años y su consumo diario comienza a los 14,3 años), el alcohol (en esta población, se prueba por primera vez, como media, a los 14 años y se comienza a consumir semanalmente a los 15), las sustancias volátiles (13,9 años, como media) y los hipnosedantes sin receta médica (la primera ingesta ocurre, como media, a los 14,5 años).

El primer consumo del resto de sustancias se produce, como término medio, a partir de los 15 años. El éxtasis, los alucinógenos y las anfetaminas presentan las edades de inicio más avanzadas, en torno a los 16 años.

No hay variaciones significativas en la edad de inicio en la mayor parte de las drogas respecto a 2002, si bien en el caso de las sustancias volátiles se comienzan a consumir, como media, casi un año antes y la heroína, en torno a un año y medio más tarde.

Tabla 3. Evolución de la edad media de inicio (en años) al consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años

	2002	2006
Alcohol	13,9	14,0
Alcohol (consumo semanal)	15,2	15,0
Tabaco	13,5	13,2
Tabaco(consumo diario)	14,5	14,3
S. Volátiles	14,7	13,9
Hipnosedantes*	14,9	14,5
Cannabis	15,0	14,9
Heroína	13,8	15,4
Cocaína	15,7	15,7
Éxtasis	15,6	15,9
Alucinógenos	15,6	15,9
Anfetaminas	15,8	16,2

*Sin receta médica

3.3. DIFERENCIAS EN EL CONSUMO DE DROGAS SEGÚN GÉNERO

En función del género, se observan notables diferencias, en cuanto a la extensión del consumo de drogas.

Los porcentajes que consumen las distintas sustancias ilegales son mayores entre chicos que entre las chicas. Esta diferencia se hacen, además, más acusadas a medida que el consumo es más reciente.

Sin embargo, el tabaco y los hipnosedantes sin receta médica son más consumidos por las chicas. El consumo de alcohol, en estas edades, se encuentra muy igualado entre los dos géneros.

Las diferencias detectadas en función del género son paralelas a las que se detectan en el conjunto de la población andaluza de 12 a 64 años⁴, con ciertas variaciones. Así, el consumo no médico de hipnosedantes entre la población general, a diferencia de su consumo bajo prescripción médica, es mayor entre los hombres que entre las mujeres. Por otro lado, en el conjunto de la población andaluza, el consumo de tabaco y de alcohol también se encuentra más extendido entre los hombres que entre las mujeres.

⁴ La Población Andaluza ante las Drogas, 2007. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía.

Tabla 4. Evolución de las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años, según sexo (%)

	2002		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Consumo alguna vez en la vida				
Tabaco	48,8%	62,1%	39,9%	48,5%
Alcohol	70,8%	74,3%	77,9%	78,0%
Hipnosedantes*	4,9%	7,7%	6,2%	10,0%
Cannabis	31,0%	27,7%	32,9%	28,1%
Éxtasis	5,5%	3,8%	4,4%	2,4%
Alucinógenos	3,5%	2,8%	5,6%	2,0%
Anfetaminas	3,2%	5,6%	3,5%	1,6%
Cocaína	6,8%	4,1%	6,8%	3,6%
Heroína	0,5%	0,3%	1,5%	0,4%
I. Volátiles	3,3%	2,2%	3,6%	1,9%
Consumo en los últimos 12 meses				
Alcohol	69,7%	73,3%	72,0%	73,1%
Hipnosedantes*	3,0%	5,6%	3,6%	6,6%
Cannabis	27,1%	23,2%	27,5%	21,7%
Éxtasis	3,7%	2,5%	3,6%	1,6%
Alucinógenos	2,5%	1,8%	4,1%	1,0%
Anfetaminas	2,4%	1,9%	3,0%	1,1%
Cocaína	5,6%	3,2%	5,0%	2,0%
Heroína	0,4%	0,1%	1,2%	0,3%
I. Volátiles	2,3%	1,2%	2,2%	1,0%
Consumo en los últimos 30 días				
Tabaco	20,7%	32,0%	23,6%	30,0%
Alcohol	51,6%	53,5%	55,6%	54,2%
Hipnosedantes*	2,0%	3,2%	1,6%	3,1%
Cannabis	19,0%	13,3%	19,4%	12,8%
Éxtasis	1,0%	2,8%	2,2%	0,5%
Alucinógenos	1,3%	0,9%	1,7%	0,3%
Anfetaminas	1,0%	0,9%	1,6%	0,4%
Cocaína	3,6%	1,6%	2,9%	0,9%
Heroína	0,2%	0,1%	0,9%	0,1%
I. Volátiles	1,0%	0,7%	1,7%	0,6%

*Sin receta médica

3.4. DIFERENCIAS EN EL CONSUMO DE DROGAS POR EDAD

En la población estudiada, el consumo de todas las sustancias se hace más extensivo a medida que se incrementa la edad, hasta alcanzar las prevalencias más elevadas entre el alumnado de 18 años.

Únicamente, las sustancias volátiles presentan prevalencias de consumo alguna vez en la vida y en el último año, más altas entre los estudiantes de 17 años que entre los de 18; se trata, pues, de un tipo de consumo muy vinculado a edades tempranas, que empieza a descender a partir de los 17 años.

Esta tendencia ascendente con la edad de los consumos es coherente con los resultados obtenidos en la encuesta de población general andaluza⁵. En la población general las prevalencias de consumo más altas se producen en los grupos de edad de 21 a 24 años o más para las diversas sustancias. Es decir, las prevalencias de consumo continúan aumentando más allá de los 18 años. Los inhalables son una excepción, ya que presentan un consumo más extendido en el grupo de 16 a 20 años de edad.

En cuanto a las prevalencias de consumo detectadas, es preciso tener en cuenta que el alumnado de secundaria de 18 años no constituye un grupo representativo de las personas andaluzas de esa edad en general. A partir de los 16 años, una parte de la población andaluza se incorpora al mercado laboral y no continúa sus estudios; por otro lado, a los 18 años una proporción importante ha finalizado los estudios de secundaria y se encuentra cursando estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior. En la muestra estudiada, el 89% de los estudiantes de 18 años habían repetido al menos un curso, motivo por el cual se encontraban cursando estudios de secundaria.

⁵ La Población Andaluza ante las Drogas, 2007. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía.

Tabla 5. Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años, según edad (porcentajes)

Edad (años)	14	15	16	17	18
Consumo Alguna Vez en la Vida					
Alcohol	49,5%	72,0%	86,3%	89,1%	91,0%
Tabaco	26,1%	37,6%	50,1%	51,4%	59,4%
Cannabis	9,2%	23,4%	31,9%	37,9%	53,0%
Cocaína	0,4%	1,7%	4,8%	5,9%	15,2%
Hipnosedantes*	6,6%	6,8%	7,8%	9,7%	11,5%
Éxtasis	0,6%	0,8%	2,3%	4,4%	10,7%
Alucinógenos	0,8%	2,3%	3,3%	3,5%	10,4%
Anfetaminas	0,4%	0,8%	1,7%	2,4%	9,0%
Inhalables Volátiles	0,6%	1,9%	3,2%	3,9%	3,1%
Heroína	0,4%	0,4%	1,3%	1,1%	1,1%
Consumo en los últimos 12 meses					
Alcohol	42,5%	66,0%	83,1%	83,3%	85,6%
Tabaco	17,9%	26,7%	36,9%	38,6%	45,6%
Cannabis	8,0%	18,5%	24,4%	31,7%	42,3%
Cocaína	0,4%	1,1%	2,6%	4,5%	10,1%
Éxtasis	0,2%	0,6%	1,7%	3,6%	7,9%
Anfetaminas	0,2%	0,6%	1,3%	2,0%	7,6%
Hipnosedantes*	3,7%	4,7%	4,6%	6,7%	7,3%
Alucinógenos	0,2%	1,1%	2,3%	2,7%	7,0%
Inhalables Volátiles	0,0%	1,5%	1,9%	2,4%	1,4%
Heroína	0,2%	0,4%	1,0%	0,8%	1,1%
Consumo en los últimos 30 días					
Alcohol	26,3%	40,5%	64,6%	68,6%	72,7%
Tabaco	12,3%	20,4%	29,9%	33,8%	41,4%
Cannabis	4,5%	11,2%	14,7%	21,4%	29,9%
Cocaína	0,2%	0,2%	1,9%	2,4%	5,1%
Anfetaminas	0,0%	0,2%	0,9%	0,8%	3,7%
Éxtasis	0,0%	0,2%	1,6%	1,8%	3,1%
Alucinógenos	0,0%	0,4%	1,3%	0,8%	2,8%
Hipnosedantes*	2,1%	2,1%	2,2%	3,2%	2,5%
Inhalables volátiles	0,0%	1,3%	1,6%	0,9%	1,4%
Heroína	0,0%	0,4%	0,7%	0,6%	0,3%

*Sin receta médica

3.5. CONSUMO DE TABACO

La prevalencia de consumo de tabaco se ha reducido con respecto a 2002 tanto entre los chicos como entre las chicas, pero este descenso es mucho más notable entre ellas. Así, el consumo diario de tabaco entre las chicas pasa del 22,8% al 16%, mientras que entre los chicos se reduce del 14,4% al 13,4%.

A pesar de este mayor descenso entre las chicas, la prevalencia de consumo de tabaco sigue siendo mayor entre ellas. Sin embargo, el consumo entre los niños es más intensivo: la media de cigarrillos diarios es de 7,1 entre los chicos y de 5,2 entre las chicas.

Las edades de inicio son prácticamente iguales para ambos géneros, tanto en lo referente a la prueba como al consumo diario de esta sustancia y a penas se han modificado con respecto a 2002.

Tabla 6. Características generales del consumo de tabaco entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-16 años (Medias y Porcentajes), según sexo.

	2002		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Prevalencia consumo de tabaco alguna vez en la vida	48,9%	62,0%	39,9%	48,5%
Edad media e inicio del consumo de tabaco en fumadores actuales y exfumadores	13,2	13,3	13,0	13,3
Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días	20,7%	32,0%	23,6%	30,0%
Prevalencia de consumo diario de tabaco	14,4%	22,8%	13,4%	16,0%
Edad media de inicio en el consumo diario de tabaco en fumadores actuales y exfumadores (años)	14,7	14,4	14,2	14,4
Nº Cigarrillos consumidos diariamente				
1 a 5	44,1%	54,7%	56,5%	62,6%
6 a 10	32,9%	30,8%	20,0%	25,1%
11 a 20	21,2%	12,8%	17,9%	8,6%
21 o más	1,9%	1,5%	3,5%	0,6%
Nº Medio cigarrillos diarios	7,8	6,6	7,1	5,2
Número de Encuestados	1075	1477	1208	1542

3.6. Consumo de bebidas alcohólicas

El alcohol es la sustancia cuyo consumo está más extendido entre los estudiantes de 14 a 18 años. El 78% lo ha probado alguna vez, el 72,6% lo ha tomado en el último año y el 54,8% en el último mes. Las prevalencias de consumo son muy similares entre ambos géneros.

A medida que avanza la edad, el porcentaje de estudiantes que bebe aumenta, alcanzando la proporción del 72,7% de consumidores en el último mes entre los estudiantes de 18 años.

La prevalencia de consumo de alcohol se ha incrementado respecto a 2002, sobre todo entre los chicos. El consumo reciente –en el último mes- también ha aumentado, tanto en fines de semana como en días laborables; de nuevo, este incremento se produce principalmente entre los chicos.

El consumo de alcohol se concentra en fines de semana. El 54,7% del alumnado ha tomado bebidas alcohólicas algún fin de semana del último mes, mientras que el porcentaje de los que han bebido en días laborables es del 18,3%. En este último indicador (consumo de alcohol en días laborables) sí se observa un consumo más extendido entre los chicos (23,8%) que entre las chicas (13,9%).

Los indicadores de consumo habitual –consumo todos los fines de semana y consumo todos los días laborables- muestran una disminución de esta pauta de consumo, principalmente en el consumo en días laborables. En 2006, el 20,6% de los estudiantes encuestados beben todos los fines de semana (22,7% chicos y 18,8% chicas). En días laborables el consumo habitual es mucho más reducido (2,3% entre los chicos y 0,8% entre las chicas).

Por lo tanto, se incrementa la prueba y el consumo reciente de alcohol, pero se reduce su consumo habitual, principalmente, en días laborables.

En cuanto al consumo excesivo, atendiendo a la frecuencia de borracheras en el último mes, se observa una situación estable, sin modificaciones significativas respecto a 2002. El porcentaje de chicos que se han emborrachado alguna vez en el mes previo a la realización de la encuesta es del 30,8% y entre las chicas es del 25,9%.

Por otro lado, en 2006 se ha introducido otro indicador de consumo excesivo, conocido como *binge drinking* o *atracones de alcohol*: un 27,1% del alumnado (32,8% entre los chicos y 22,7% entre las chicas) indica haber consumido 5 o más cañas o copas en una misma ocasión, al menos una vez en el último mes. Como puede verse, tanto la frecuencia de borracheras en el último mes como los atracones de alcohol se producen más entre los chicos que entre las chicas.

En cuanto a la edad de inicio al consumo de alcohol, tampoco se observan diferencias en estos años. En función del género, las edades medias de inicio se encuentran muy próximas. La prueba de esta sustancia se produce en torno a los 14 años y el comienzo del consumo semanal en torno a los 15, tanto entre los chicos como entre las chicas.



Tabla 7. Características generales del consumo de alcohol entre los estudiantes de enseñanzas secundarias, según sexo (porcentajes).

	2002		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Prevalencia Consumo de alcohol alguna vez en la vida	70,8%	74,3%	77,9%	78,0%
Edad media e inicio del consumo de alcohol (años)	13,7	14,1	13,8	14,1
Edad media e inicio del consumo semanal de alcohol (años)	15,2	15,6	14,9	15,0
Prevalencia de consumo de alcohol en últimos 12 meses	69,7%	73,3%	72,0%	73,1%
Prevalencia de consumo de alcohol en últimos 30 días	51,6%	53,5%	55,6%	54,2%
Prevalencia de consumo de alcohol en fin de semana últimos 30 días	51,3%	53,2%	55,4%	54,2%
Prevalencia de consumo de alcohol TODOS los fines de semana últimos 30 días	24,1%	18,1%	22,7%	18,8%
Prevalencia de consumo de alcohol en días laborables últimos 30 días	18,6%	10,8%	23,8%	13,9%
Prevalencia de consumo de alcohol TODOS los días laborables últimos 30 días	3,8%	1,5%	2,3%	0,8%
Frecuencia de borracheras en los últimos 30 días, entre los estudiantes que han consumido alcohol en estos 30 días				
Ninguna borrachera	69,2%	76,1%	69,2%	74,1%
1 a 2 borracheras	19,8%	18,6%	19,1%	19,3%
3 a 5 borracheras	7,2%	3,9%	8,4%	5,3%
Más de 5 borracheras	3,8%	1,4%	3,3%	1,3%
<i>Número de encuestados</i>	<i>1075</i>	<i>1477</i>	<i>1208</i>	<i>1542</i>

En cuanto al tipo de bebidas consumidas, en general, las más consumidas entre los estudiantes de 14 a 18 años son los combinados o cubatas. El 50,1% refiere haberlos consumido algún fin de semana del último mes. En días laborables, la cerveza se consume más que los combinados (10,4% señala haber tomado cerveza en días laborables).

Tabla 8. Prevalencia del Consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas en días laborables y fin de semana durante los 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 (Porcentajes)

	2002	2006
Consumo Días Laborables		
Algún día de lunes a jueves durante los últimos 30 días		
Vino	4,2%	4,8%
Cerveza	6,8%	10,4%
Aperitivos	1,2%	2,4%
Combinados	4,6%	9,3%
Licores fuertes	2,2%	3,6%
Licores frutas	3,5%	4,8%
Todos los días de lunes a jueves durante los últimos 30 días		
Vino	0,3%	0,5%
Cerveza	1,2%	1,4%
Aperitivos	0,2%	0,3%
Combinados	0,2%	0,9%
Licores fuertes	0,0%	0,6%
Licores frutas	0,2%	0,8%
Consumo algún Fin de semana		
Algún día de viernes a domingo durante los últimos 30 días		
Vino	12,4%	12,3%
Cerveza	17,6%	19,4%
Aperitivos	5,5%	5,6%
Combinados	43,4%	50,1%
Licores fuertes	18,6%	18,0%
Licores frutas	15,2%	13,8%
Todos los días de viernes a domingo durante los últimos 30 días		
Vino	5,0%	3,9%
Cerveza	12,9%	10,0%
Aperitivos	2,3%	1,5%
Combinados	31,3%	31,0%
Licores fuertes	12,3%	6,9%
Licores frutas	6,0%	3,3%

Los lugares donde los estudiantes suelen conseguir bebidas alcohólicas son los bares y pubs (67,2%), discotecas (57,6%), supermercados (53,4%) e hipermercados (38,5%).

El 26% del alumnado reconoce haber sido pasajero en los últimos 12 meses de vehículos conducidos por alguien que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Este porcentaje asciende al 39,7% entre los estudiantes de 18 años.

El 10% de las personas consultadas declara haber conducido en los últimos 12 meses un vehículo (coche o moto) bajo los efectos del alcohol, cifra que asciende al 17,5% entre las personas de 18 años.

3.7. Consumo de tranquilizantes y somníferos

En el cuestionario de 2006 se ha incluido una pregunta sobre consumo de tranquilizantes o somníferos en general, sin hacer especificar sobre la existencia o no de prescripción médica para su uso. Además, se ha mantenido la pregunta de años precedentes sobre consumo de tranquilizantes o somníferos sin receta médica.

En 2006, el 12,1% de los estudiantes había consumido tranquilizantes o somníferos alguna vez en la vida, un 7,2% en los últimos 12 meses y un 3,4% en los últimos 30 días.

El consumo sin receta médica se sitúa en el 8,3% alguna vez en la vida, 5,3% en los últimos doce meses y 2,4% en el último mes. Al contrario de los que ocurre con el resto de sustancias ilegales, el consumo de hipnosedantes se encuentra más extendido entre las chicas que entre los chicos.

La edad de inicio del consumo de tranquilizantes y somníferos sin receta médica se sitúa en torno a los 14 años y es muy similar para los chicos y para las chicas (14,2 años entre los chicos y 14,4 entre las chicas).

La frecuencia de consumo de estos psicofármacos es esporádica: en el último mes, la proporción de los que los han consumido 10 o más días es del 0,2%.



Tabla 9. Características generales del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años, según sexo.

	2002		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Prevalencia uso hipnosedantes con receta alguna vez en la vida	6,0%	9,3%	10,5%	13,4%
Prevalencia uso hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	4,8%	7,7%	6,2%	10,0%
Edad media al inicio del consumo de hipnosedantes (años)	14,6	14,9	14,2	14,4
Prevalencia uso de hipnosedantes sin receta últimos 12 meses	3,0%	5,6%	3,6%	6,6%
Prevalencia uso hipnosedantes sin recetas en últimos 30 días	2,0%	3,2%	1,6%	3,1%
Frecuencia uso hipnosedantes sin recetas últimos 30 días				
Nunca	97,9%	96,9%	98,4%	96,9%
1 a 2 días	1,5%	2,0%	0,8%	2,4%
3 a 5 días	0,5%	0,5%	0,2%	0,4%
6 a 9 días	0,0%	0,5%	0,2%	0,1%
10 a 19 días	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
20 a 29 días	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%
<i>Número Encuestados</i>	<i>1075</i>	<i>1477</i>	<i>1208</i>	<i>1542</i>

3.8. Consumo de cannabis

El cannabis es la droga ilegal más extendida entre la población española y andaluza en particular; igualmente, es la más consumida entre el alumnado de secundaria de 14 a 18 años. Un 30,2% lo ha probado alguna vez, un 24,3% lo ha consumido en el último año y un 15,7% en el último mes.

Este consumo está más extendido entre los chicos que entre las chicas, sobre todo cuando se trata de pautas de consumo más intensas. Así, el porcentaje de consumidores diarios de cannabis es de un 2,9%, el doble en los chicos (4,2%) que en las chicas (1,8%).

La edad media de inicio al consumo de esta sustancia es similar entre ambos géneros y se sitúa próxima a los 15 años.

Tabla 10. Características generales del consumo de cannabis entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes y medias), según sexo.

	2002		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Prevalencia consumo cannabis alguna vez en la vida	31,2%	27,7%	32,9%	28,1%
Edad media al inicio del consumo de cannabis (años)	14,9	15,1	14,7	15,0
Prevalencia de consumo de cannabis en últimos 12 meses	27,1%	23,2%	27,5%	21,7%
Prevalencia de consumo de cannabis en últimos 30 días	19,0%	13,3%	19,4%	12,8%
Frecuencia consumo cannabis últimos 30 días				
Nunca	81,0%	86,7%	80,6%	87,2%
1 a 2 días	6,8%	6,7%	6,5%	5,9%
3 a 5 días	3,0%	2,6%	4,1%	2,7%
6 a 9 días	2,9%	1,8%	2,2%	1,2%
10 a 19 días	2,7%	0,9%	2,4%	1,2%
20 a 29 días	3,6%	1,3%	4,2%	1,8%
<i>Número de Encuestados</i>	<i>1075</i>	<i>1477</i>	<i>1208</i>	<i>1542</i>

Entre el alumnado de secundaria, la extensión y la frecuencia de consumo de cannabis aumenta con la edad. El 30% de los estudiantes de 18 años consumieron cannabis en el último mes y un 10,8% lo hizo más de 10 días en ese periodo.

Tabla 11. Frecuencia de consumo de hachís en los últimos 30 días entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años, según edad (porcentajes)

Edad	14	15	16	17	18
Ningún día	95,5%	88,8%	85,3%	78,6%	70,0%
Algún día					
1 a 2 días	3,3%	5,1%	6,3%	7,3%	9,3%
3 a 9 días	1,0%	3,4%	4,6%	6,9%	9,9%
10 a 19 días	0,0%	1,5%	1,3%	2,7%	3,4%
20 o más días	0,2%	1,1%	2,5%	4,4%	7,4%

3.9. Consumo de cocaína

La cocaína es, después del cannabis, la droga cuyo consumo está más extendido entre el alumnado de secundaria: un 5% la ha consumido alguna vez en su vida, un 2,5% en el último año y un 1,8% en el último mes.

Su consumo está notablemente más extendido entre los chicos que entre las chicas, tanto en lo que se refiere a la prueba como a los consumos más recientes y habituales.

La edad media de inicio al consumo de cocaína es prácticamente igual para ambos géneros: 15,7 en los chicos y 15,8 en las chicas.

Con respecto al año 2002, se observa un descenso del consumo de esta sustancia entre los estudiantes de secundaria.

Tabla 12. Características generales del consumo de cocaína ente los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes), según sexo.

	2002		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Prevalencia de consumo de cocaína alguna vez en la vida	6,8%	4,1%	6,8%	3,6%
Edad media al inicio del consumo de cocaína (años)	15,8	15,7	15,7	15,8
Prevalencia de consumo de cocaína en últimos 12 días	5,6%	3,2%	5,0%	2,0%
Prevalencia de consumo de cocaína en últimos 30 días	3,6%	1,6%	2,9%	0,9%
Frecuencia de consumo de cocaína en últimos 30 días				
Nunca	96,3%	98,4%	97,1%	99,1%
1 a 2 días	1,8%	1,2%	1,3%	0,6%
3 a 5 días	1,2%	0,2%	0,6%	0,1%
6 a 9 días	0,4%	0,2%	0,2%	0,0%
10 a 19 días	0,2%	0,0%	0,3%	0,0%
20 a 29 días	0,1%	0,0%	0,4%	0,2%
<i>Número Encuestados</i>	<i>1075</i>	<i>1477</i>	<i>1208</i>	<i>1542</i>

3.10. Consumo de éxtasis

El consumo de éxtasis es minoritario entre el alumnado de secundaria y ha descendido con respecto a los datos obtenidos en 2002 para esta población. En 2006, un 3,3% de los estudiantes de 14 a 18 años había tomado en alguna ocasión esta droga, un 2,5% la ha consumido en el último año y un 1,3% en el último mes.

Su consumo es más reducido entre las chicas y en ambos géneros se trata de un consumo esporádico.

La edad media de inicio en el consumo se sitúa en los 15,9 años, sin variaciones significativas en función del sexo.

Tabla 13. Características generales del consumo de éxtasis entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes), según sexo.

	2002		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida	5,5%	3,8%	4,4%	2,4%
Edad media al inicio del consumo de éxtasis (años)	15,8	15,4	15,8	15,9
Prevalencia de consumo de éxtasis en últimos 12 días	3,7%	2,5%	3,6%	1,6%
Prevalencia de consumo de éxtasis en últimos 30 días	1,2%	0,8%	2,2%	0,5%
Frecuencia de consumo de éxtasis en últimos 30 días				
Nunca	98,8%	99,2%	97,8%	99,5%
1 a 2 días	1,0%	0,6%	1,7%	0,4%
3 a 5 días	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
6 a 9 días	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
10 a 19 días	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20 a 29 días	0,0%	0,0%	0,3%	0,1%
<i>Número Encuestados</i>	<i>1075</i>	<i>1477</i>	<i>1208</i>	<i>1542</i>

3.11. Consumo de anfetaminas

Bajo esta denominación se recoge la anfetamina y la metanfetamina, tanto en forma de base como en forma de sal y tanto en polvo como en comprimidos.

Se trata de un consumo minoritario entre el alumnado andaluz de secundaria. En 2006, el 2,4% lo había probado alguna vez en la vida, un 1,9% lo había consumido en el último año y un 0,9% en el último mes. El consumo de estas sustancias es esporádico, en el último mes lo había consumido durante más de 10 días un el 0,2% del alumnado.

Su consumo está algo más extendido entre los chicos, si bien entre ellos es también minoritario.

Con respecto a 2002 no se detectan modificaciones significativas en las prevalencias de consumo de anfetaminas.

La edad de inicio en este consumo se situó en los 16,2 años, siendo similar en ambos sexos.

Tabla 14. Características generales del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes), según sexo.

	2002		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida	3,2%	2,7%	3,5%	1,6%
Edad media al inicio del consumo de anfetaminas (años)	15,8	15,5	16,1	16,3
Prevalencia de consumo de anfetaminas en últimos 12 días	2,4%	1,9%	3,0%	1,1%
Prevalencia de consumo de anfetaminas en últimos 30 días	1,0%	0,9%	1,6%	0,4%
Frecuencia de consumo de anfetaminas en últimos 30 días				
Nunca	99,9%	99,1%	98,4%	99,6%
1 a 2 días	0,9%	0,7%	1,0%	0,3%
3 a 5 días	0,0%	0,2%	0,2%	0,1%
6 a 9 días	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10 a 19 días	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
20 a 29 días	0,1%	0,0%	0,3%	0,1%
Número Encuestados	1075	1477	1208	1542

3.12. Consumo de alucinógenos

En 2006, el 3,6% del alumnado de secundaria había tomado alguna vez en la vida alucinógenos, el 2,4 los había consumido en el último año y el 0,9% en el último mes.

Su consumo es superior entre los chicos, que además presentan una edad de inicio media algo menor que la de las chicas (15,8 años frente a 16,2).

Entre los chicos se observa un incremento de este consumo con respecto a 2002, al contrario de lo que ocurre en el grupo de las chicas.

Tabla 15. Características generales del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes), según sexo.

	2002		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida	3,4%	2,8%	5,6%	2,0%
Edad media al inicio del consumo de alucinógenos (años)	15,9	15,4	15,8	16,2
Prevalencia de consumo de alucinógenos en últimos 12 meses	2,5%	1,8%	4,1%	1,0%
Prevalencia de consumo de alucinógenos en últimos 30 días	1,3%	0,9%	1,7%	0,3%
Frecuencia de consumo de alucinógenos en últimos 30 días				
Nunca	98,7%	99,1%	98,3%	99,7%
1 a 2 días	0,9%	0,8%	0,9%	0,2%
3 a 5 días	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%
6 a 9 días	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
10 a 19 días	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
20 a 29 días	0,1%	0,0%	0,5%	0,1%
<i>Número Encuestados</i>	<i>1075</i>	<i>1477</i>	<i>1208</i>	<i>1542</i>

3.13. Consumo de heroína

El consumo de heroína es el menos extendido entre esta población. En 2006, un 0,9% del alumnado había probado alguna vez esta sustancia, un 0,7% la había consumido en el último año y un 0,4% en el último mes.

Si bien es también un consumo muy minoritario, afecta más a los chicos que a las chicas (el 1,2% de ellos la habían consumido en el último año, frente al 0,3% de ellas).

La edad media de inicio en este consumo es inferior para los chicos: 14,5 años frente a 16 años en el caso de las chicas.

En 2006 se aprecia un ligero aumento del consumo de heroína con respecto a los datos de 2002, que habrá que seguir en las próximas encuestas.

Tabla 16. Características generales del consumo de heroína entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes) según sexo.

	2002		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida	0,5%	0,4%	1,5%	0,4%
Edad media al inicio del consumo de heroína (años)	14,0	13,5	14,5	16,0
Prevalencia de consumo de heroína en últimos 12 meses	0,4%	0,1%	1,2%	0,3%
Prevalencia de consumo de heroína en últimos 30 días	0,2%	0,1%	0,9%	0,1%
Frecuencia de consumo de heroína en últimos 30 días				
Nunca	99,8%	99,9%	99,1%	99,9%
1 a 2 días	0,1%	0,1%	0,5%	0,0%
3 a 5 días	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%
6 a 9 días	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10 a 19 días	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20 a 29 días	0,0%	0,0%	0,3%	0,1%
<i>Número Encuestados</i>	<i>1075</i>	<i>1477</i>	<i>1208</i>	<i>1542</i>

3.14. Consumo de inhalables volátiles

Según indican las encuestas poblacionales, el consumo de estas sustancias se produce principalmente a edades muy tempranas⁶. Aún así su consumo es reducido también entre los más jóvenes. Entre los estudiantes de secundaria, un 2,6% refiere haberlos consumido en alguna ocasión, un 1,5% indica que los consumió en el último año y un 1,1% en el último mes.

Estas sustancias son más consumidas por los hombres que por las mujeres. El 3,6% de los chicos las habían probado alguna vez en la vida, y además, lo hacen a edades más jóvenes que las chicas. La edad media de inicio entre ellos se sitúa en los 13,2 años, mientras que entre las chicas se encuentra en los 14,9 años.

Con respecto a 2002 no se aprecian diferencias significativas en los niveles de consumo de inhalables.

Tabla 17. Características generales del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años.

	2002		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Prevalencia de consumo de sustancias volátiles alguna vez en la vida	3,3%	2,2%	3,6%	1,9%
Edad media al inicio del consumo de sustancias volátiles (años)	15,0	14,4	13,2	14,9
Prevalencia de consumo de sustancias volátiles en últimos 12 meses	2,3%	1,2%	2,2%	1,0%
Prevalencia de consumo de sustancias volátiles en últimos 30 días	1,0%	0,7%	1,7%	0,6%
Frecuencia de consumo de sustancias volátiles en últimos 30 días				
Nunca	99,0%	99,3%	98,3%	99,4%
1 a 2 días	0,7%	0,3%	0,9%	0,4%
3 a 5 días	0,1%	0,2%	0,3%	0,1%
6 a 9 días	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
10 a 19 días	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
20 a 29 días	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%
<i>Número Encuestados</i>	<i>1075</i>	<i>1477</i>	<i>1208</i>	<i>1542</i>

3.15. Policonsumo de sustancias psicoactivas

En la siguiente tabla se muestra la proporción de los que han consumido una determinada droga en los últimos 12 meses y ha consumido también otra droga en el mismo periodo.

⁶ La Población Andaluza ante las Drogas, 2007. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de

El 94,8% de los que han consumido tabaco en los últimos doce meses, han consumido también alcohol en ese periodo y el 59,4% cannabis.

Entre los que consumieron alcohol en el último año, el 43% ha fumado en ese periodo y el 32,4% ha consumido cannabis.

El 55,5% del alumnado que consumió hipnosedantes en el último año, también consumió tabaco y el 87,7% alcohol. Además, un 45,9% de ellos consumieron cannabis y el 13% cocaína.

Entre las personas que consumieron cannabis en ese periodo, el 97,2% bebió alcohol, el 80,7% fumó tabaco y el 13% consumió cocaína.

De los estudiantes que consumieron éxtasis en los últimos 12 meses, el 88,2% consumió tabaco en ese periodo, el 98,5% bebió alcohol, el 88,2% consumió cannabis, el 66,2% tomó cocaína, el 44,1% consumió anfetaminas, el 42,6% alucinógenos, el 25% sustancias volátiles y el 22,1% hipnosedantes sin receta médica.

Entre las personas que habían consumido alucinógenos en el último año, un 95,5% había consumido también alcohol, un 83,3% tabaco, un 87,9% cannabis, un 51,5% cocaína y un 43,9% anfetaminas y éxtasis.

De las personas que consumieron anfetaminas, el 100% consumió también alcohol, el 86,8% tabaco, el 84,9% cannabis, el 58,5% cocaína, el 56,6% éxtasis y el 54,7% alucinógenos.

Entre las personas que habían consumido cocaína en el último año, el 97,8% había consumido también alcohol, el 84,8% tabaco, el 94,6% cannabis, el 48,9% éxtasis, el 37% alucinógenos y el 33,7% anfetaminas.

Entre los estudiantes que refieren haber consumido heroína en el último año, un 84,2% indica que consumió también tabaco, todos ellos consumieron alcohol, el 89,5% consumió cannabis y el 73,7% tomó éxtasis y cocaína.

Un 95,2% de las personas que indicaron haber consumido sustancias volátiles, tomaron también alcohol, el 83,3% de ellos consumió cannabis y un 71,4% fumó tabaco.

Tabla 18. Prevalencia de consumo de distintas drogas psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años que han consumido en el mismo periodo cada una de las drogas consideradas en la cabecera de cada columna (porcentajes).

Prevalencia de consumo	Tabaco	Alcohol	Hipno Sedantes*	Cannabis	Éxtasis	Alucinógenos	Anfetaminas	Cocaína	Heroína	I. Volátiles
Tabaco	100%	43,0%	55,5%	80,7%	88,2%	83,3%	86,8%	84,8%	84,2%	71,4%
Alcohol	94,8%	100%	87,7%	97,2%	98,5%	95,5%	100	97,8%	100%	95,2%
Hipnosedantes sin receta médica	8,9%	6,4%	100%	10,0%	22,1%	24,2%	22,6%	20,7%	36,8%	31,0%
Cannabis	59,4%	32,4%	45,9%	100%	88,2%	87,9%	84,9%	94,6%	89,5%	83,3%
Éxtasis	6,6%	3,4%	10,3%	9,0%	100%	43,9%	56,6%	48,9%	73,7%	40,5%
Alucinógenos	6,1%	3,2%	11,0%	8,7%	42,6%	100%	54,7%	37,0%	47,4%	42,9%
Anfetaminas	5,1%	2,7%	8,2%	6,7%	44,1%	43,9%	100%	33,7%	57,9%	23,8%
Cocaína	8,6%	4,5%	13,0%	13,0%	66,2%	51,5%	58,5%	100%	73,7%	52,4%
Heroína	1,8%	1,0%	4,8%	2,5%	20,6%	13,6%	20,8%	15,2%	100%	21,4%
Inhalables Volátiles	3,3%	2,0%	8,9%	5,2%	25,0%	27,3%	18,9%	23,9%	47,4%	100%
<i>Nº personas</i>	<i>(906)</i>	<i>(1997)</i>	<i>(146)</i>	<i>(667)</i>	<i>(68)</i>	<i>(66)</i>	<i>(53)</i>	<i>(92)</i>	<i>(19)</i>	<i>(42)</i>

*Sin receta médica

3.16. Riesgo percibido ante el consumo de drogas

El riesgo percibido hacia los distintos consumos y su frecuencia actúa como un factor que puede hacer más probable la aparición del consumo o, por el contrario, hacerla menos probable. En este informe se analiza la proporción del alumnado que percibe un alto riesgo ante distintas conductas de consumo (% que piensa que una determinada conducta puede provocar bastantes o muchos problemas).

Las conductas consideradas más arriesgadas por los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14 a 18 años son el consumo habitual de éxtasis, heroína y de cocaína (más del 95% de las personas encuestadas piensa que estas conductas pueden provocar bastantes o muchos problemas para la salud).

El consumo esporádico de heroína, éxtasis y cocaína también se considera arriesgado, aunque algo menos que su consumo habitual.

Entre el 86,8% y el 89,9% del alumnado considera que consumir tranquilizantes de manera habitual, fumar tabaco diariamente y el consumo habitual de cannabis puede provocar bastantes o muchos problemas de salud.

Consumir cannabis esporádicamente es considerado peligroso para la salud por el 67,1% de las personas entrevistadas y consumir tranquilizantes esporádicamente lo es para el 62%.

Las conductas de consumo de drogas que los estudiantes asocian a un menor riesgo están relacionadas con el consumo de alcohol. Concretamente, el 51% piensa que consumir 5 o 6 cañas o copas los fines de semana puede provocar problemas para la salud y el 51,4% piensa que puede provocarlos consumir 1 o 2 cañas o copas cada día.

Con respecto a 2002, la distribución de las diversas conductas en función de su peligrosidad para la salud es prácticamente la misma, pero el porcentaje del alumnado que considera peligrosas cada una de ellas se ha incrementado de forma significativa. Es decir, en estos cuatro años se observa un importante incremento de la percepción del riesgo, especialmente en las conductas referidas al consumo esporádico de sustancias, tal como puede apreciarse en la siguiente tabla.



Tabla 19. Percepción de riesgo ante distintas conductas de consumo de drogas entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentaje que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas).

	2002	2006	Incremento %
Consumir éxtasis habitualmente	88,4%	97,1%	8,7
Consumir heroína habitualmente	89,8%	97,0%	7,2
Consumir cocaína habitualmente	89,4%	96,8%	7,4
Consumir heroína esporádicamente	67,9%	92,2%	24,3
Consumir éxtasis esporádicamente	59,1%	91,5%	32,4
Consumir cocaína esporádicamente	63,5%	91,0%	27,5
Consumir cannabis habitualmente	79,4%	89,9%	10,5
Consumir tabaco diariamente (un paquete diario)	76,4%	87,8%	11,4
Consumir tranquilizantes habitualmente	77,9%	86,8%	8,9
Consumir cannabis esporádicamente	39,2%	67,1%	27,9
Consumir tranquilizantes esporádicamente	33,0%	62,0%	29
Consumir alcohol (1 o 2 cañas/copas al día)	37,0%	51,4%	14,4
Consumir alcohol (5 o 6 cañas/copas el fin de semana)	43,8%	51,0%	7,2

Atendiendo a las diferencias en función del género, se observa que el riesgo para la salud percibido por las mujeres es superior al percibido por los hombres para todas las conductas consideradas.

Tabla 20. Riesgo percibido asociado al consumo habitual de sustancias psicoactivas, según sexo (porcentaje que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas).

	2006	
	Hombre	Mujer
Consumir éxtasis habitualmente	95,6%	98,1%
Consumir heroína habitualmente	95,5%	98,1%
Consumir cocaína habitualmente	95,1%	98,1%
Consumir heroína esporádicamente	89,8%	94,0%
Consumir éxtasis esporádicamente	89,5%	93,1%
Consumir cocaína esporádicamente	89,4%	92,2%
Consumir anfetaminas esporádicamente	89,2%	93,2%
Fumar hachís habitualmente	86,2%	92,7%
Fumar tabaco diario	86,0%	89,1%
Tomar tranquilizantes/somníferos habitualmente	85,2%	87,9%
Consumir cannabis esporádicamente	70,8%	77,3%
Beber alcohol en fin de semana	48,6%	52,8%
Consumir alcohol a diario	47,7%	54,3%
Número de encuestados	1208	1542

3.17. Disponibilidad de drogas percibida por los entrevistados

La percepción de disponibilidad de las diversas sustancias psicoactivas es también un factor que puede relacionarse con la probabilidad de consumirlas. Como puede apreciarse en la siguiente tabla, el alumnado de enseñanzas secundarias de 14 a 18 años en Andalucía tiene una percepción de mayor dificultad para conseguir la mayoría de las sustancias que en 2002, excepto en el caso de las bebidas alcohólicas y del cannabis, para las que se ha incrementado el porcentaje de quienes piensan que es fácil o muy fácil conseguirlas.

El 84,6% del alumnado cree que sería fácil o muy fácil conseguir alcohol y el 51,3% piensa que resultaría fácil o muy fácil obtener cannabis en un plazo de 24 horas.

Tabla 21. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes que piensa que es fácil/muy fácil).

	2002	2006
Bebidas alcohólicas	81,6%	84,6%
Hachís/marihuana	47,7%	51,3%
Tranquilizantes/pastillas para dormir	52,8%	43,2%
Cocaína	29,7%	24,7%
Alucinógenos	29,3%	20,8%
Éxtasis	34,9%	20,3%
Anfetaminas	27,9%	18,1%
Heroína	20,8%	16,6%
Número Encuestados	2552	2750

En general, los chicos perciben como más fácilmente disponibles las diversas sustancias psicoactivas, excepto los tranquilizantes y pastillas para dormir, que las chicas encuentran algo más fáciles de conseguir. La disponibilidad de las bebidas alcohólicas se encuentra muy igualada entre ambos sexos.

Por lo tanto, los chicos encuentran significativamente más accesibles las sustancias ilegales que las chicas. La mayor diferencia se encuentra en la disponibilidad del cannabis.

Tabla 21.1 Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas, según sexo (porcentajes que piensa que es fácil/muy fácil).

	Hombres	Mujeres
Bebidas alcohólicas	84,9%	84,4%
Hachís/marihuana	57,2%	46,8%
Tranquilizantes/pastillas para dormir	42,2%	44,0%
Cocaína	28,0%	22,2%
Alucinógenos	24,3%	18,0%
Éxtasis	23,9%	17,5%
Anfetaminas	21,7%	15,4%
Heroína	19,4%	14,4%
<i>Número Encuestados</i>	<i>1208</i>	<i>1542</i>

Atendiendo a la edad, la percepción de disponibilidad aumenta con la edad de las personas entrevistadas. Destaca la alta percepción de disponibilidad a las bebidas alcohólicas que tienen los más jóvenes: el 68,4% del alumnado de 14 años encuentra fácil o muy fácil conseguirlas y el 79,8% de las personas entrevistadas de 15 años también lo consideran así.

Los tranquilizantes son también percibidos como fácilmente accesibles en estas edades: el 31,2% de los estudiantes de 14 años piensa que puede obtenerlos fácilmente y en el caso de los de 15 años, lo piensa así el 37,8%.



Tabla 21.2 Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas, según edad (porcentajes que piensa que es fácil/muy fácil).

	14	15	16	17	18
Bebidas alcohólicas	68,4%	79,8%	89,6%	91,5%	92,4%
Hachís/marihuana	24,6%	38,0%	58,0%	65,2%	71,3%
Tranquilizantes/pastillas para dormir	31,2%	37,8%	43,6%	51,4%	53,0%
Cocaína	11,1%	15,7%	26,4%	31,5%	42,0%
Alucinógenos	9,0%	14,4%	23,1%	25,0%	34,9%
Éxtasis	9,6%	14,4%	22,4%	24,2%	33,5%
Anfetaminas	8,4%	12,5%	19,8%	22,4%	29,6%
Heroína	8,8%	11,3%	19,3%	20,2%	23,7%
<i>Número Encuestados</i>	513	529	693	660	355

3.18. Información recibida sobre drogas

En cuanto a la valoración de los estudiantes sobre la información que reciben en materia de drogas, el 43,5% se siente perfectamente informado y un 41,6% cree que tiene suficiente información. El 2,4% se siente mal informado sobre drogas, este último porcentaje pese a ser reducido, ha aumentado con respecto a 2002.

Tabla 22. Autovaloración de la información recibida sobre drogas por los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes).

	2002	2006
Perfectamente informado	42,5%	43,5%
Suficientemente informado	42,9%	41,6%
Informado a medias	12,9%	12,5%
Mal Informado	1,7%	2,4%

En función de la edad de las personas encuestadas, los porcentajes más altos de quienes se sienten mal informados sobre drogas se encuentran entre el alumnado de 14 años (3,9%) y el de 18 años (3,1%).

Tabla 22.1 Autovaloración de la información recibida sobre drogas, según edad (porcentajes).

	14	15	16	17	18
Perfectamente informado	40,6%	45,6%	41,2%	45,0%	46,3%
Suficientemente informado	42,7%	39,8%	44,0%	40,5%	39,8%
Informado a medias	12,7%	11,8%	12,6%	13,7%	10,8%
Mal Informado	3,9%	2,7%	2,2%	0,8%	3,1%

Por otra parte, el 71,5% del alumnado de Enseñanzas Secundarias afirma que en su actual centro educativo ha recibido información o ha tratado el tema del consumo de drogas y sus efectos y problemas asociados.

Por tipo de ciclo formativo se detectan diferencias significativas. Entre el alumnado de ESO el 80,1% afirma haber recibido esta información en su centro, entre los estudiantes de bachillerato la han recibido el 70,2% y entre las personas que cursan un ciclo formativo de grado medio este porcentaje se reduce al 45,8%.

Precisamente, los datos sobre consumo de alguna sustancia ilegal en el último año indican una mayor necesidad de actuaciones preventivas entre el alumnado de ciclos formativos de grado medio, ya que en este colectivo se detecta un porcentaje de personas que han consumido alguna sustancia ilegal significativamente mayor que en ESO y en Bachillerato. Entre los estudiantes de ESO, el 17% afirma haber consumido alguna sustancia ilegal en el último año, este porcentaje es del 29,6% entre los estudiantes de bachillerato y entre quienes cursan un ciclo formativo de grado medio asciende al 39,4%.



4. PRINCIPALES RESULTADOS

- El **alcohol** es la sustancia más consumida entre el alumnado de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, en Andalucía. Su uso se ha incrementado con respecto a 2002 tanto en lo relativo a la prueba como a su consumo reciente, si bien su consumo habitual se ha reducido. Las prevalencias de consumo de esta sustancia son muy similares entre ambos sexos, aunque en los días laborables los chicos lo consumen más que las chicas. El consumo excesivo también afecta más a los chicos.
- El **tabaco** es la segunda sustancia con prevalencias de consumo más elevadas. Respecto a 2002 se ha reducido el porcentaje de estudiantes que ha fumado alguna vez. Su consumo reciente y diario se reduce principalmente entre las chicas, pero no entre los chicos. A pesar de ese descenso, en estas edades el consumo femenino de esta sustancia sigue siendo mayor que el masculino.
- El **cannabis** es con diferencia la sustancia ilegal más extendida entre el alumnado de secundaria. El 15,7% de los estudiantes lo ha consumido en el último mes. Las prevalencias de consumo de esta sustancia se encuentran estabilizadas con respecto a las de 2002.
- El consumo de **hipnosedantes** sin receta médica se ha incrementado con respecto a la encuesta de 2002, excepto el consumo reciente. Al contrario de lo que ocurre con el resto de sustancias ilegales, este consumo se encuentra más extendido entre las chicas que entre los chicos; además, ellas consideran más fácil que los chicos obtener estos psicofármacos.
- En 2006 se detecta una reducción de las prevalencias de consumo de **cocaína** entre el alumnado de secundaria andaluz, aunque sigue siendo la sustancia ilegal más consumida después del cannabis. El 5% del alumnado la ha consumido alguna vez en la vida, el 2,5% en el último año y el 1,8% en el último mes.
- Se reduce también la prueba y el consumo en el último año de **éxtasis**, aunque el consumo reciente parece estabilizado. Se trata de un consumo minoritario y esporádico, más extendido entre los chicos que entre las

chicas. El 3,3% del alumnado ha consumido alguna vez esta sustancia y el 1,3% lo ha hecho en el último mes.

- En Andalucía, al igual que en el conjunto del país, se detecta en la encuesta a estudiantes de secundaria un cierto incremento del consumo de heroína. Se trata de un aumento muy reducido, que será preciso confirmar en las próximas ediciones del estudio, ya que también podría deberse a variaciones porcentuales propias del trabajo con muestras poblacionales. En 2006, el porcentaje del alumnado que ha consumido heroína alguna vez en la vida es del 0,9% y en el último mes el 0,4%.
- El consumo del **resto de sustancias** (alucinógenos, sustancias volátiles y anfetaminas) son también minoritarios y no se aprecian diferencias significativas en los niveles de consumo con respecto a 2002.
- La **percepción del riesgo** para la salud asociado al consumo de las diversas sustancias psicoactivas se ha incrementado de manera notable con respecto a 2002, sobre todo en lo que se refiere a las conductas de consumo esporádico de sustancias. El riesgo percibido por las chicas es superior al percibido por los chicos para todas las conductas consideradas.
- En 2006, el alumnado de secundaria tiene una **percepción** de mayor **dificultad para conseguir** la mayoría de las **sustancias psicoactivas** que en 2002, excepto en el caso de las bebidas alcohólicas y del cannabis, para las que ha aumentado el porcentaje de quienes piensan que es fácil o muy fácil conseguirlas. Los chicos encuentran significativamente más accesible las sustancias ilegales que las chicas, sobre todo en el caso del cannabis. Además, la percepción de disponibilidad aumenta con la edad.
- Destaca la alta percepción de disponibilidad de bebidas alcohólicas que tienen los más jóvenes: el 68,4% del alumnado de 14 años encuentra fácil o muy fácil conseguirlas y el 79,8% de las personas entrevistadas de 15 años también lo consideran así.
- En cuanto a la valoración de los estudiantes sobre la **información** que reciben en materia de drogas, el 85,1% se siente suficiente o perfectamente informados. El 2,4% se considera mal informado, este porcentaje es mayor que el 1,7% del alumnado que se sentía mal informado en 2002.

- El 71,5% de las personas consultadas afirma que **en su actual centro educativo** ha recibido información sobre las drogas y sus efectos y problemas asociados. Este porcentaje varía en función del ciclo educativo cursado: entre el alumnado de ESO, el 80,1% afirma que ha recibido información en su centro, entre las personas que cursan bachillerato, el 70,2% ha recibido esta información y entre quienes cursan un ciclo formativo de grado medio, el porcentaje de personas que han recibido esta información en su centro se reduce al 45,8%.

