

# 6

## INDICADORES

### Incidencia del registro del hábito tabáquico

<b>Dimensión</b>	Indicador de proceso.
<b>Fórmula</b>	Número de personas con registro del hábito tabáquico según proceso (diferenciadas por edad y sexo) x100/ pacientes distintos vistos en el período.
<b>Criterio</b>	<p>Este indicador puede ser monitorizado en AP y en el Hospital. En el caso de que no se dispongan de registros informatizados que automáticamente permitan conocer si la persona ha sido preguntada por su hábito tabáquico, se tendrá que recurrir al muestreo de historias clínicas.</p> <p>La identificación y el registro se considerará válido solo si se hace mención de las características de calidad, según se indica en el proceso: presencia o ausencia del consumo (persona fumadora, no fumadora y exfumadora) y exposición al humo de tabaco ambiental (ACHT). Si es exfumadora (&gt; 1 año sin fumar), preguntar el tiempo que hace que dejó de fumar y valorar el estadio de cambio (persona exfumadora en fase de consolidación o finalización) y si es fumadora, evaluar el estadio (Precontemplativo, Contemplativo, Preparación para la Acción, Acción, Mantenimiento) y preguntar por otros datos de interés (nº de cigarrillos al día, edad de inicio y/o paquetes/año) e intervención.</p>
<b>Estándar</b>	90%
<b>Definición de términos</b>	Ver glosario.
<b>Fuente</b>	DIRAYA o Historia Clínica de Atención Especializada.
<b>Periodicidad</b>	Anual.

## Incidencia de uso de la Intervención Básica

<b>Dimensión</b>	Indicador de proceso.
<b>Fórmula</b>	Número de personas fumadoras a las que se le realiza Intervención Básica (diferenciado por edad y sexo) x 100/ pacientes atendidos y atendidas en el período que afirman ser fumadores o fumadoras.
<b>Criterio</b>	<p>Este indicador puede ser monitorizado en AP y en el hospital. En caso de no disponerse de registros informatizados que automáticamente informen del número de personas fumadoras identificadas y a las que se les realiza Intervención Básica, se tendrá que recurrir al muestreo de historias clínicas.</p> <p>En aquellas personas en las que la Intervención Básica se haya realizado en el año anterior, deberán tenerla también realizada en el año en curso (siempre que hayan acudido al centro sanitario) para que se pueda dar el caso como válido e incluirlo en el numerador.</p> <p>La Intervención Básica se considerará válida solo si se hace mención de las características de calidad, según se indica en el proceso.</p>
<b>Estándar</b>	80%
<b>Definición de términos</b>	Ver glosario.
<b>Fuente</b>	DIRAYA o Historia Clínica de Atención Especializada.
<b>Periodicidad</b>	Anual.

## Incidencia de uso de la Intervención Avanzada Individual

<b>Dimensión</b>	Indicador de proceso.
<b>Fórmula</b>	Número de personas fumadoras a las que se le realiza Intervención Avanzada Individual (diferenciado por edad y sexo) x100/ pacientes atendidos en el período que afirman ser fumadores.
<b>Criterio</b>	<p>Este indicador puede ser monitorizado en AP y en el Hospital. En caso de no disponerse de registros informatizados que automáticamente informen del número de personas fumadoras a las que se les realiza Intervención Avanzada, se tendrá que recurrir al muestreo de historias clínicas.</p> <p>En aquellas personas en las que la Intervención Avanzada Individual se haya realizado en el año anterior, deberán tener también realizados los seguimientos pertinentes ( a los 6 y 12 meses del día "D") en el año en curso, para que se pueda dar el caso como válido e incluirlo en el numerador.</p> <p>La Intervención Avanzada Individual se considerará válida solo si se hace mención de las características de calidad, según se indica en el proceso.</p>
<b>Estándar</b>	Definición a posteriori, una vez implantado el proceso.
<b>Definición de términos</b>	Ver glosario.
<b>Fuente</b>	DIRAYA y programa de gestión de citas de servicios hospitalarios.
<b>Periodicidad</b>	Anual.

## Incidencia de uso de la Intervención Avanzada Grupal

<b>Dimensión</b>	Indicador de proceso.
<b>Fórmula</b>	Número de personas fumadoras a las que se le realiza Intervención Avanzada Grupal (diferenciado por edad y sexo) x 100/ pacientes atendidos en el período que afirman ser fumadores o fumadoras.
<b>Criterio</b>	<p>Este indicador puede ser monitorizado en AP y en el Hospital. En caso de no disponerse de registros informatizados que automáticamente informen del número de personas fumadoras a las que se les realiza Intervención Avanzada Grupal, se tendrá que recurrir al muestreo de historias clínicas.</p> <p>En aquellas personas en las que la Intervención Avanzada se haya realizado en el año anterior, deberán tener también realizados los seguimientos pertinentes (6 y 12 meses del día "D") en el año en curso, para que se pueda dar el caso como válido e incluirlo en el numerador.</p> <p>La Intervención Avanzada grupal se considerará válida solo si se hace mención de las características de calidad, según se indica en el proceso.</p>
<b>Estándar</b>	Definición a posteriori, una vez implantado el proceso.
<b>Definición de términos</b>	Ver glosario.
<b>Fuente</b>	DIRAYA e Historia Clínica de Atención Especializada.
<b>Periodicidad</b>	Anual.

## Incidencia de registro en los informes de alta

<b>Dimensión</b>	Indicador de proceso.
<b>Fórmula</b>	Nº de informes clínicos de consulta, de alta hospitalaria y/o de continuidad de cuidados de enfermería en los que conste el diagnóstico del hábito tabáquico, tratamiento recomendado y derivación a AP o Especializada según criterios establecidos para seguimiento en el proceso (diferenciado por edad y sexo) x 100 / Nº total de informes de alta del servicio en el período.
<b>Estándar</b>	90%
<b>Definición de términos</b>	Ver glosario.
<b>Fuente</b>	DIRAYA e Historia Clínica de Atención Especializada.
<b>Periodicidad</b>	Anual.

## Incidencia de recaída en Intervención Básica

<b>Dimensión</b>	Indicador de resultado.
<b>Fórmula</b>	$N^{\circ}$ personas fumadoras que presentan recaída a los 6 y/o 12 meses del día "D" (diferenciado por edad y sexo) $\times 100 / n^{\circ}$ de personas fumadoras sobre las que se ha realizado una intervención básica.
<b>Criterio</b>	Este indicador puede ser monitorizado en AP y en el Hospital. En caso de no disponerse de registros informatizados que automáticamente informen del número de personas fumadoras que presentan una recaída a los 6 y/o 12 meses del "Día D", se tendrá que recurrir al muestreo de historias clínicas.
<b>Estándar</b>	Definición a posteriori, una vez implantado el proceso.
<b>Definición de términos</b>	Ver glosario.
<b>Fuente</b>	DIRAYA e Historia Clínica de Atención Especializada.
<b>Periodicidad</b>	Anual.

## Incidencia de recaída en Intervención Avanzada

<b>Dimensión</b>	Indicador de resultado.
<b>Fórmula</b>	$N^{\circ}$ personas fumadoras que presentan recaída a los 6 y/o 12 meses del día "D" (diferenciado por edad y sexo) $\times 100 / n^{\circ}$ de personas fumadoras sobre las que se ha realizado una intervención avanzada.
<b>Criterio</b>	Este indicador puede ser monitorizado en AP y en el Hospital. En caso de no disponerse de registros informatizados que automáticamente informen del número de personas fumadoras que presentan una recaída a los 6 y/o 12 meses del "Día D", se tendrá que recurrir al muestreo de historias clínicas.
<b>Estándar</b>	Definición a posteriori, una vez implantado el proceso.
<b>Definición de términos</b>	Ver glosario.
<b>Fuente</b>	DIRAYA e Historia Clínica de Atención Especializada.
<b>Periodicidad</b>	Anual.

## Incidencia de abandono en Intervención Básica

<b>Dimensión</b>	Indicador de resultado.
<b>Fórmula</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N° de personas fumadoras a las que se les realiza sólo Intervención Básica y se mantienen sin fumar a los 12 meses de haberlo registrado en Historia Clínica (diferenciado por edad y sexo) x 100/ n° de personas fumadoras sobre las que se hace sólo Intervención Básica.</li> <li>• N° de personas fumadoras a las que se les realiza sólo Intervención Básica y se mantienen sin fumar a los 5 años de haberlo registrado en Historia Clínica (diferenciado por edad y sexo) x 100/ n° de personas fumadoras sobre las que se hace sólo Intervención Básica.</li> </ul>
<b>Criterio</b>	Este indicador puede ser monitorizado en AP y en el hospital. En caso de no disponerse de registros informatizados que automáticamente informen del número de personas fumadoras que se mantienen sin fumar al año de la Intervención Básica (seguimiento a los 12 meses de haberlo registrado en Historia Clínica) se tendrá que recurrir al muestreo de historias clínicas.
<b>Estándar</b>	Definición a posteriori, una vez implantado el proceso.
<b>Definición de términos</b>	Ver glosario.
<b>Fuente</b>	DIRAYA e Historia Clínica de Atención Especializada.
<b>Periodicidad</b>	Anual.

## Incidencia de abandono en Intervención Avanzada Individual (IAI)

<b>Dimensión</b>	Indicador de resultado.
<b>Fórmula</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N° personas a las que se les realiza IAI y se mantienen sin fumar a los 12 meses de la IAI seguimiento a los 12 meses del día "D" (diferenciado por edad y sexo) x 100/ n° de personas sobre las que se hace IAI en el período.</li> <li>• N° personas a las que se les realiza IAI y se mantienen sin fumar a los 5 años de la IAI (diferenciado por edad y sexo) x 100/ n° de personas sobre las que se hace IAI en el período.</li> </ul>
<b>Criterio</b>	Este indicador puede ser monitorizado en AP y en el Hospital. En caso de no disponerse de registros informatizados que automáticamente informen del número de personas fumadoras que se mantienen sin fumar al año de la Intervención Avanzada (seguimiento a los 12 meses del día "D"), se tendrá que recurrir al muestreo de historias clínicas.
<b>Estándar</b>	Definición a posteriori, una vez implantado el proceso.
<b>Definición de términos</b>	Ver glosario.
<b>Fuente</b>	DIRAYA e Historia Clínica de Atención Especializada.
<b>Periodicidad</b>	Anual.

## Incidencia de abandono en Intervención Avanzada Grupal (IAG)

<b>Dimensión</b>	Indicador de resultado.
<b>Fórmula</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº personas a las que se les realiza IAG y se mantienen sin fumar a los 12 meses de la IAG (seguimiento a los 12 meses del día "D" (diferenciado por edad y sexo) x 100 / nº de personas sobre las que se hace IAG en el período.</li> <li>Nº personas a las que se les realiza IAG y se mantienen sin fumar a los 5 años de la IAG (diferenciado por edad y sexo) x 100/ nº de personas sobre las que se hace IAG en el período.</li> </ul>
<b>Criterio</b>	Este indicador puede ser monitorizado en AP y en el Hospital. En caso de no disponerse de registros informatizados que automáticamente informen del número de personas fumadoras que se mantienen sin fumar al año de la Intervención Avanzada (seguimiento a los 12 meses del día "D"), se tendrá que recurrir al muestreo de historias clínicas.
<b>Estándar</b>	Definición a posteriori, una vez implantado el proceso.
<b>Definición de términos</b>	Ver glosario.
<b>Fuente</b>	DIRAYA e Historia Clínica de Atención Especializada.
<b>Periodicidad</b>	Anual.

## Incidencia de abandono en Intervención Avanzada

<b>Dimensión</b>	Indicador de resultado.
<b>Fórmula</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº personas a las que se les realiza IAI con tratamiento farmacológico (Anexo VII) y se mantienen sin fumar a los 12 meses de la IAI con fármacos (seguimiento a los 12 meses del día "D"), (diferenciado por edad y sexo) x 100/ nº de personas sobre las que se hace IAI con tratamiento farmacológico en el período.</li> <li>Nº personas a las que se les realiza IAI con tratamiento farmacológico (Anexo VII) y se mantienen sin fumar a los 5 años de la IAI (diferenciado por edad y sexo) x 100/ nº de personas sobre las que se hace IAI con tratamiento farmacológico (Anexo VII) en el período.</li> </ul>
<b>Criterio</b>	Este indicador puede ser monitorizado en AP y en el hospital. En caso de no disponerse de registros informatizados que automáticamente informen del número de personas fumadoras que se mantienen sin fumar al año de la intervención avanzada (seguimiento a los 12 meses del día "D"), se tendrá que recurrir al muestreo de historias clínicas.
<b>Estándar</b>	Definición a posteriori, una vez implantado el proceso.
<b>Definición de términos</b>	Ver glosario.
<b>Fuente</b>	DIRAYA e Historia Clínica de Atención Especializada.
<b>Periodicidad</b>	Anual.

## Incidencia de abandono en Intervención Avanzada Grupal (IAG) con tratamiento farmacológico

<b>Dimensión</b>	Indicador de resultado.
<b>Fórmula</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N° personas a las que se les realiza IAI con tratamiento farmacológico (Anexo VII) y se mantienen sin fumar a los 12 meses de la IAI con fármacos del anexo VII (diferenciado por edad y sexo) x 100/ n° de personas sobre las que se hace IAI con tratamiento farmacológico en el período.</li> <li>• N° personas a las que se les realiza IAI con tratamiento farmacológico (Anexo VII) y se mantienen sin fumar a los 5 años de la IAI con fármacos del anexo VII (diferenciado por edad y sexo) x 100/ n° de personas sobre las que se hace IAI con tratamiento farmacológico en el período.</li> </ul>
<b>Criterio</b>	Este indicador puede ser monitorizado en AP y en el Hospital. En caso de no disponerse de registros informatizados que automáticamente informen del número de personas fumadoras que se mantienen sin fumar al año de la Intervención Avanzada con fármacos (seguimiento a los 12 meses del día "D"), se tendrá que recurrir al muestreo de historias clínicas.
<b>Estándar</b>	Definición a posteriori, una vez implantado el proceso.
<b>Definición de términos</b>	Ver glosario.
<b>Fuente</b>	DIRAYA e Historia Clínica de Atención Especializada.
<b>Periodicidad</b>	Anual.

