

BIBLIOGRAFÍA

- Abrams DB, Brown R, Niaura RS, Emmons K, Goldstein M, Monti PM. *The Tobacco Dependence Treatment Handbook: A Guide to Best Practices*. New York, Guilford Press. 2003.
- Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. *Evaluación de la eficacia, efectividad y coste-efectividad de los distintos abordajes terapéuticos para dejar de fumar*. Madrid, septiembre de 2003; n.º 40.
- American Psychiatric Association. *DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, texto revisado*. Barcelona: Masson. 2005.
- Ayesta FJ, Álvarez S, Benito BM (eds). *Manual de tabaquismo para profesionales sanitarios*. Ceuta; Ingesa-CSCAC, 2006.
- Ayesta FJ, Otero M. El tabaquismo como una enfermedad crónica. En *Tratado de tabaquismo*, Jiménez-Ruiz CA, Fagerström KO (eds), Aula Médica. Madrid 2004: 107-117.
- Baker TB, Brandon TH, Chassin L. Motivational influences on cigarette smoking. *Annu Rev Psychol* 2004; 55: 463-91.
- Balcells M, Torres M, Yahne CE. La terapia motivacional en el tratamiento del tabaquismo. *Adicciones* 2004; 16(S2): 227-236.
- Barrueco Ferrero B, Hernández Mezquita MA. *Manual de Prevención y tratamiento del Tabaquismo*. Madrid; Pauan SL. 2001.
- Barrueco M. Tres minutos de atención al paciente fumador. Diagnóstico y tratamiento no farmacológico del tabaquismo: utilidad del consejo médico y de la intervención mínima sistematizada. *SEMERGEN* 2002; 28(9); 471-3.
- Barrueco M, Hernández MA y Torrecilla M (eds.). *Manual de prevención y tratamiento del tabaquismo*. Madrid: ERGON (2ªed.) 2003.
- Becoña, E. y Lorenzo, M.C. Evaluación de la conducta de fumar I. Medidas conductuales, escalas y cuestionarios. *Revista intercontinental de Psicología y Educación* 1989; 2, 13-15.
- Becoña E, Palomares A, García MP. *Tabaco y salud: Guía de prevención y tratamiento del tabaquismo*. Madrid; Pirámide. 1994.
- Becoña E. Evaluación de la conducta de fumar. En: Graña JL, ed. *Conductas adictivas. Teoría, evaluación y tratamiento*. Madrid: Debate 1994; 403-454.
- Becoña, E. Evaluación de la conducta de fumar. En J.L. Graña (Ed.), *Conductas adictivas. Teoría, evaluación y tratamiento*. Madrid: Debate 1994; pp.457-491.
- Becoña Vázquez F. *Tratamiento del Tabaquismo*. Madrid; Dickynson 1998.
- Becoña E, Vazquez FL. The Fagerström Test for Nicotine Dependence in a Spanish sample. *Psychol Rep* 1998; 83: 1455-1458.
- Becoña, E. Cómo ayudar a los fumadores a dejar de fumar, según su nivel de motivación. En Becoña, E. *Guía clínica para ayudar a los fumadores a dejar de fumar*. Valencia: Socidrogalcohol 2004; pp. 31-59.

- Becoña, E. La nicotina como droga. En Becoña, E. (ed.) Monografía tabaco. Valencia: Socidrogalcohol 2004; pp.143-154.
- Becoña E, Lorenzo MC. Evaluación de la conducta de fumar. Adicciones: revista de socidrogalcohol 2004 ; 16(supl.2) : 201-226.
- Cabezas MC. Novedades en la intervención sobre el consumo de tabaco desde la AP. Aten Primaria 2000; 25(8): 140-46.
- Caggiula AR, Donny EC, White AR, Chaudhri N, Booth S, Gharib MA, Hoffman A, Perkins KA, Sved AF. Cue dependence of nicotine self-administration and smoking. Pharmacol Biochem Behav 2001; 70: 515-530.
- Cahill K, Stead LF, Lancaster T. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.:CD006103. DOI: 10.1002 /14651858.CD006103.pub.2.
- Carrión F, Furest Carrasco I, Pascual JM, Marín J. Intervención mínima en tabaquismo en España. Arch Bronconeumología 2000; 36(3):124-28.
- Casas M, Gossop M. Tratamientos psicológicos en drogodependencias. Sitges: Ediciones en Neurociencias 1993: 85-136
- Chiamulera C. Cue reactivity in nicotine and tobacco dependence: a "multiple-action" model of nicotine as a primary reinforcement and as an enhancer of the effects of smoking-associated stimuli. Brain Res Rev 2005; 48:74-97.
- Clemente M.L. et al. Descripción de las guías disponibles en España para el abordaje del tabaquismo en AP. Aten Primaria 1999; 24:101-108.
- Di Clemente CC. Addiction and change: how addictions develop and addicted people recover. New York; Guilford Press. 2003
- EMEA European Medicines Agency. Scientific discussion. Champix (Varenicline). EMEA/2006. Disponible en: <http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/champix/champix.htm>.
- Escuela Andaluza de Salud Pública. Encuesta de expectativas de usuarios y profesionales hacia el tabaquismo. Granada 2004.
- Ferry L, Johnston JA. Efficacy and safety of bupropión SR for smoking cessation: data from clinical trials and five years of postmarketing experience. Int J Clin Practice 2003; 57: 224-30.
- Ficha técnica Champix® (Laboratorio Pzifer). Sept, 2006.
- Filozof C, Fernandez Pinilla MC, Fernandez- Cruz A. Smoking cessation and weight gain. Obes Rev 2004; 5: 95-103.
- Fiore MC, Bailey WC, Cohen SC, Dorfman SF, Goldstein MG, Gritz ER, et al. Treating tobacco use and dependence. Clinical Practice Guideline. Agency for Healthcare Research and Quality publication n° 00-032. Rockville: US Department of Health and Human Services; 2000.
- Foxx, R.M. y Brown, R.A. Nicotine fading, self-monitoring for cigarette abstinence or controlled smoking. Journal of Applied Behavior Analysis 1979; 12: 115-125.
- Fuentes-Pila JM, Calatayud P, López E, Castañeda B. La entrevista motivacional: llave del proceso de cambio en la dependencia nicotín-tabáquica. Trastornos Adictivos. 2005; 7:153-165.
- González-Ruiz M, Tejero MA, Armijo JA. Bupropión: dos años de experiencia en el Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV). III Jornadas de Farmacovigilancia. Toledo 2002.

- Gonzalez D et al. for the Varenicline Phase 3 Study Group. Varenicline, an $\alpha 4\beta 2$ nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation. A randomized controlled trial. *JAMA* 2006; 296: 47-55.
- Gordon M. Diagnóstico enfermero. Proceso y aplicación. 3ª Ed. Madrid: Mosby-Doyma; 1996.
- Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Rickert WS, Robinson J. The Fagerström Test for Nicotine Dependence: A revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. *Br J Addict* 1991; 86: 1119-1127.
- Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Rickert WS, Robinson J. Measuring the heaviness of smoking: using self-reported time to the first cigarette of the day and number of cigarettes smoked per day. *Br J Addict*. 1989; 84:791-799.
- Hughes JR et al. Antidepresivos para dejar de fumar (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2007 Número 1. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: <http://www.update-software.com> (Traducida de The Cochrane Library, 2007 Issue 1. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).
- Jamrozik K. Population strategies to prevent smoking. *BMJ*. 2004; 328:759-62.
- Jiménez Ruiz CA, Barrueco Ferrero M, Solano Reina S, et al. Recomendaciones en el abordaje diagnóstico y terapéutico del tabaquismo. Documento de consenso. *Archivos de Bronconeumología* 2003;39(1):35-41.
- Jiménez Ruiz CA, Granda Orive I, Solano Reina S, Carrión F, Romero Palacios P, Barruela Ferrero M. Recomendaciones para el tratamiento del tabaquismo. *ArchBronconeumol* 2003; 39: 514-23.
- Jorenby DE et al for the Varenicline Phase 3 Study Group. Efficacy of varenicline, an $\alpha 4\beta 2$ nicotine acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation. A randomized controlled trial. *JAMA* 2006; 296: 56-63.
- Lancaster T, Stead L, Silagy C, Sowden A. Effectiveness of interventions to help people stop smoking: findings from the Cochrane Library. *BMJ*. 2000; 321:355-8.
- Lancaster T, Stead LF. Asesoramiento médico para el abandono del hábito de fumar (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2006 Número 1. Oxford: Update Software Ltd.
- Lichtenstein, E. y Brown, R.A. Smoking cessation methods: Review and recommendations. En W.R. Miller (Ed.), *The addictive behaviors. Treatment of alcoholism, drug abuse, smoking and obesity*. Nueva York: Pergamon Press. 1980; pp.169-206.
- Llorens N, Perelló M, Palmer A. Las estrategias de afrontamiento: factores de protección en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis. *Adicciones* 2004, 16: 261-266.
- McCloskey J, Bulechek GM. Clasificación de Intervenciones de Enfermería NIC (Nursing Interventions Classification). 4ª Edición. 2005. Madrid, Elsevier España.
- McRobbie H, Lee M, Juniper Z. Non-Nicotine pharmacotherapies for smoking cessation. *Respir Med* 2005; 99: 1203-12.
- Millner WR, Rollnick S. La entrevista motivacional. Barcelona, Paidós, 1999.
- Ministerio de Sanidad y Consumo. Prevalencia del consumo de tabaco en los profesionales sanitarios del INSALUD 1998. Madrid 1999.

- Ministerio de Sanidad y consumo. Tercer Plan de Actuación para una Europa sin Tabaco (1997-2001). Disponible en: <http://www.msc.es/salud/epidemiologia/ue/directivaue.htm>
- Moorehead S, Johnson M, Maas M. Clasificación de Resultados de Enfermería NOC (Nursing Outcomes Classification). 3ª Edición. 2005. Madrid, Elsevier España.
- Munafo M, Clark T, Johnstone E, Murphy M, Walton R. The genetic basis for smoking behavior: a systematic review and meta-analysis. *Nicotine Tob Res.* 2004; 6:583-97.
- Muñoz M. Manual práctico de evaluación psicológica clínica. Madrid, Síntesis. 2003.
- A National Cancer Institute Manual. How to help your patients stop using tobacco. Washington DC: NIH Publication, 1998.
- Guidance on the use of nicotine replacement therapy (NRT) and bupropion for smoking cessation. Technology Appraisal. Guidance No. 39. March 2002. National Institute of Clinical Excellence.
- Final Appraisal determination Vareniclina for smoking cessation. Guidance. Mayo 2007. National Institute of Clinical Excellence.
- Olano Espinosa E, Matilla Pardo B, González Díaz M, Martínez González, S. El consejo para dejar de fumar: por qué, cuándo y cómo debemos darlo a nuestros pacientes. *Atención Primaria* 2005; 36(1):45-49.
- Orem DE. Modelo de Orem. Conceptos de enfermería en la práctica. Barcelona, Masson-Salvat; 1993.
- Organización Mundial de la Salud CIE-10. Trastornos mentales y del comportamiento. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. Madrid: Meditor, 2002 p. 11: 25-26.
- Otero M, Ayesta FJ. Cómo dejar de fumar. Málaga, Argual. 2004.
- Parrot S, Godfrey C, Raw M, West R, McNeil A. Guidance for commissioners on the cost-effectiveness of smoking cessation interventions. *Thorax* 1998; 53 Suppl 5:1-38.
- Prochaska JO, DiClemente CC. Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. *J Consulting and Clinical Psychology.* 1983; 51: 390-395.
- Prochaska JO, DiClemente CC, Norcross JC. In search of how people change: Applications to addictive behavior. *Am Psychologist.* 1992; 47: 1102-1114.
- Prochaska JO, Prochaska JM. Modelo transteórico de cambio para conductas adictivas. En M. Casas y M. Gossop (eds.), *Recaída y prevención de recaídas.* Rodríguez M, Santamaría J. Diagnóstico y evaluación. En Ayesta y col. (eds), *Manual de tabaquismo para profesionales sanitarios,* Ingresa-CSCAC, 2006:74-80.
- Ralph SS, Craft-Rosenberg M, Herdman H, Lavin MA. NANDA (North American Nursing Diagnosis Association). *Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación 2003 – 2004.* Madrid, Elsevier España.
- Samet J, Yoon SY (eds). *Women and the tobacco epidemic,* The World Health Organization. 2001.
- Sánchez J. Guía de Tabaquismo para Enfermería. 2005. Disponible en <http://www14.brinkster.com/enfertabac/doc03.htm>
- Sanz Pozo B, de Miguel Díez J, Camarelles Guillem F. Deshabitación tabáquica: actitud terapéutica ante los pacientes en fase de preparación. *Rev Clín Esp* 2004; 204(8):425-9.

- Shea SC. La entrevista psiquiátrica: el arte de comprender. Madrid, Elsevier Science. 2002.
- Silagy C, Otead LF. Physician advice for smoking cessation (Cochrane Review). En: The Cochrane Library, Issue 3, 2001. Oxford: Update Software.
- Silagy C, Lancaster T, Otead L, Mant D, Fowler G. Terapia de reemplazo de nicotina para el abandono del hábito de fumar (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2006; 1.
- Silagy C et al. Terapia de reemplazo de nicotina para el abandono del hábito de fumar (Revisión Cochrane traducida). En La Biblioteca Cochrane Plus, 2007 Número 1. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: <http://www.update-software.com> (Traducida de The Cochrane Library, 2007 Issue 1. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).
- Tonstad S et al. for the Varenicline Phase 3 Study Group. Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation. A randomized controlled trial. JAMA 2006; 296: 64-71.
- Torrecilla, M., Plaza, M.D. y Avon, C. Intervención no farmacológica. Consejo sanitario sistematizado. En M. Barrueco, M.A. Hernández y M. Torrecilla (eds.). Manual de prevención y tratamiento del tabaquismo. Madrid: ERGON (3ªed.) 2006; pp.115-139.
- Varenicline (Chantix) for tobacco dependence. Med Lett Drug Ther 2006; 48(1241/1242): 66-8.
- Vareniclina en el tratamiento de la deshabitación tabáquica. Mayo 2007. Centro Andaluz de Documentación e Información de Medicamentos (CADIME).
- Vázquez C, Muñoz M. Entrevista diagnóstica en salud mental. Madrid, Síntesis. 2002
- West R, McNeill and Raw M. Smoking cessation guidelines for health professionals: an update. Thorax 2000; 55:987-999.