

2

DEFINICIÓN GLOBAL

Definición funcional

Conjunto de actuaciones secuenciales dirigidas a establecer el diagnóstico de colelitiasis/colelitis en pacientes con manifestaciones clínicas compatibles, y a valorar las necesidades de tratamiento, según la forma de presentación, seleccionando y consensuando con el paciente el más apropiado en cada caso. Se aportará una información adecuada a aquellas personas a las que la colelitis se les diagnostique de forma incidental, y se garantizará la continuidad en la atención asistencial a los pacientes.

Límite de entrada:

Paciente con sospecha clínica de colelitiasis/colelitis en Atención Primaria o en cualquier consulta de Atención Especializada, programada o de urgencias.

Límite de salida:

Paciente colecistectomizado que no necesita más tratamiento y se reintegra a sus actividades habituales, así como el paciente con sospecha clínica en el que no se confirma el diagnóstico de colelitiasis/colelitis.

Límites marginales:

1. Pacientes con colelitiasis que no son sometidos a colecistectomía por cualquiera de los siguientes motivos:

- Contraindicación quirúrgica de cualquier tipo.
 - No aceptación por parte del paciente, aún considerándose que está indicada.
 - Pacientes sometidos a otros tratamientos alternativos.
2. Pacientes con diagnóstico incidental de colelitiasis a los que, tras la información oportuna, se decide no intervenir quirúrgicamente.
 3. Complicaciones de la enfermedad biliar litiásica diferentes de la colecistitis aguda.
 4. Paciente menores de 14 años.

Responsable:

Profesional del equipo de Atención Primaria-Especializada, con participación activa en el desarrollo del proceso, y conocedor en profundidad del mismo, con responsabilidad, asumida voluntariamente, para la toma de decisiones.