

<b>ACE</b>	Análisis costo-efectividad
<b>AE</b>	Atención Especializada
<b>AINEs</b>	Antiinflamatorios no esteroideos
<b>AP</b>	Atención Primaria
<b>BOMT</b>	Bismuto, omeprazol, metronidazol, tetraciclina
<b>C</b>	Consenso
<b>CMV</b>	Citomegalovirus
<b>DCCU-AP</b>	Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias-Atención Primaria
<b>DF</b>	Dispepsia funcional
<b>ECC</b>	Ensayo clínico controlado
<b>ERGE</b>	Enfermedad por reflujo gastroesofágico
<b>GPC</b>	Guías de práctica clínica
<b>Hp</b>	Helicobacter pylori
<b>IBP</b>	Inhibidores de la bomba de protones
<b>MA</b>	Meta-análisis
<b>O</b>	Estudio observacional
<b>OCA</b>	Omeprazol, claritromicina, amoxicilina
<b>PEG</b>	Gastrostomía por endoscopia
<b>R</b>	Revisión convencional
<b>RRR</b>	Reducción del riesgo relativo
<b>RS</b>	Revisión sistemática
<b>SCCU-H</b>	Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias-Hospital
<b>SSPA</b>	Sistema Sanitario Público de Andalucía
<b>UD</b>	Úlcera duodenal
<b>UG</b>	Úlcera gástrica
<b>UP</b>	Úlcera péptica
<b>VDP</b>	Validación pruebas diagnósticas
<b>VHS1</b>	Virus herpes simple tipo 1