



## Glosario de términos

<b>Glosario de términos</b>	<b>Descripción</b>
<b>Alta planificada</b>	Proceso de transferencia del ciudadano desde la institución al domicilio, que se basa en la coordinación efectiva entre el paciente y los referentes familiares con los profesionales y las organizaciones. Una característica de calidad, es que se inicie desde el ingreso del mismo.
<b>Alerta o Alarma de trasplante</b>	Protocolo de actuación tras una oferta hepática, fijándose el horario y contemplándose los diferentes profesionales que intervienen.
<b>Biovigilancia</b>	La biovigilancia tiene como finalidad detectar, notificar y registrar los incidentes y reacciones adversas que puedan surgir del uso terapéutico de células, tejidos u órganos para obtener la máxima información y aplicar las medidas correctoras adecuadas para minimizar los riesgos.
<b>Candidato a trasplante hepático</b>	Paciente afecto de una enfermedad hepática crónica avanzada o aguda irreversible y que tras su evaluación es incluido en lista de espera para trasplante hepático.
<b>Centros de referencia de trasplante hepático</b>	Hospitales andaluces con Unidad de Trasplante Hepático. Cada uno tiene asignada una población definida.
<b>Cirugía del donante</b>	Cirugía para la extracción del hígado del donante
<b>Cirugía de banco</b>	Cirugía para preparación del injerto (hígado) previo al implante
<b>Consentimiento Informado (CI)</b>	Es un proceso comunicativo y participativo de carácter verbal, que se realiza en el seno de la relación profesional-paciente. Siempre debe dejarse constancia escrita de los aspectos fundamentales de este proceso de información en la Historia Clínica, como se hace con todos los demás aspectos de la actividad asistencial. (Consejería de Salud. Orden de 8 de julio de 2009. Instrucción primera. 2.)
<b>Coordinación hospitalaria de trasplante</b>	Formada por profesionales sanitarios (facultativos y de enfermería) que se encargan, entre otras labores de la detección de los donantes
<b>Coordinación autonómica de trasplante</b>	Interfaz de los profesionales (coordinadores hospitalarios) con las autoridades sanitarias. Sus objetivos básicos son incrementar la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplantes, garantizar la equidad en el acceso a los mismos, optimizar la calidad y la eficiencia y conseguir participación activa de profesionales, enfermos y diferentes agentes sociales.
<b>Disfunción primaria</b>	Situación clínica en que existe una función hepática tras el trasplante insuficiente para mantener con vida al individuo y que lleva al éxitus o al retrasplante (pasados siete días de postoperatorio)
<b>Donante en asistolia</b>	Parada cardíaca como causa de la muerte del donante
<b>Donante vivo</b>	Persona sana allegada que cede parte de su hígado, para ser implantado en una persona enferma que necesita un trasplante hepático

<b>Enfermera referente</b>	Enfermera con la que durante todo el proceso asistencial pueda el paciente establecer un vínculo estable que permita una relación terapéutica y favorezca la continuidad de cuidados intra e interniveles.
<b>Esteatosis</b>	Enfermedad del hígado caracterizada por la acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en las células hepáticas.
<b>Estudio pretrasplante</b>	Evaluación del candidato previo al trasplante.
<b>Exclusión temporal</b>	Paciente al que temporalmente no se le puede realizar el trasplante.
<b>Exclusión definitiva</b>	Paciente que definitivamente sale de lista de espera.
<b>Fallo primario</b>	No funcionamiento inmediato del injerto hepático (hasta 7 días)
<b>Fármacos vasoactivos</b>	Fármacos dirigidos a normalizar la contractilidad cardíaca (inotropos) o el tono vascular sistémico (Vasoconstrictores, vasodilatadores).
<b>Gammaglobulina hiperinmune</b>	Solución concentrada de anticuerpos contra el virus de la hepatitis B
<b>Hepatectomía e implante</b>	Cirugía en el receptor de trasplante hepático para extraer el hígado enfermo e implantar el hígado sano del donante.
<b>Hepatocarcinoma</b>	Tumor maligno primario más frecuente del hígado, habitualmente aparece en personas que ya tienen alguna enfermedad hepática de base.
<b>Hemorragia por rotura de varices</b>	Hemorragia digestiva por rotura de varices esofago-gástricas.
<b>Inclusión en lista</b>	Incorporación de los datos del candidato a la lista de espera, siendo desde ese momento posible que sea llamado para trasplante hepático.
<b>Isquemia fría</b>	Período desde el enfriamiento hasta la reperusión del órgano.
<b>Isquemia caliente</b>	Período desde el cese de la circulación hasta el enfriamiento del órgano con solución de preservación.
<b>Manejo postoperatorio</b>	Seguimiento del paciente tras la intervención quirúrgica.
<b>Seguimiento del paciente tras la intervención quirúrgica.</b>	Entidad en la que pueden aparecer manifestaciones de osteomalacia por déficit de vitamina D y de osteoporosis por reducción del contenido mineral óseo con importante dolor óseo y riesgo de fractura.
<b>Peritonitis bacteriana espontanea</b>	Infección del líquido peritoneal. Supone causa de exclusión temporal de lista de espera
<b>Priorización en Lista de espera</b>	Gestión de la Lista de espera, estableciéndose criterios objetivos para catalogar a un paciente como receptor de trasplante hepático con carácter preferente.
<b>Profilaxis recidiva viral</b>	Medidas encaminadas a evitar que el hígado trasplantado se afecte por virus de hepatitis del receptor.

<b>Quimioembolización</b>	Procedimiento por el cual se bloquea el suministro de sangre al tumor por medios quirúrgicos o mecánicos, junto con medicamentos contra el cáncer que se administran directamente al tumor.
<b>Radiofrecuencia</b>	Por medio de técnicas de imagen (ecografía, TC o RM) se guía un electrodo que genera calor dentro del tumor.
<b>Registro voluntades vitales anticipadas</b>	Registro del testamento vital. Incluye la capacidad de dejar constancia del deseo de ser donante de órganos.
<b>Retrasplante precoz y tardío</b>	Realización de un segundo trasplante hepático, antes y después de una semana.
<b>Solución preservación</b>	Líquidos empleados para minimizar las lesiones ocurridas en el hígado del donante durante el período de isquemia.
<b>Split</b>	Intervención quirúrgica para dividir los dos lóbulos hepáticos, que a su vez pueden ser utilizados en dos trasplantes hepáticos.
<b>Tiempo isquemia</b>	Tiempo sin que circule sangre por el injerto hepático.
<b>Trasplante combinado</b>	Trasplante de otro órgano además del hígado a un mismo receptor
<b>Tratamiento inmunosupresor</b>	Tratamiento farmacológico empleado para evitar el rechazo al órgano implantado.
<b>Trombosis portal</b>	Oclusión de la vena porta.

## ACRÓNIMOS

<b>AFP</b>	Alfafetoproteína
<b>AH</b>	Asistencia hospitalaria
<b>ALB</b>	Albúmina
<b>ALT</b>	Alanina transaminasa
<b>ANGIO-TC</b>	Angiografía – tomografía computarizada
<b>ANTIHBs</b>	Anticuerpo superficie virus hepatitis B
<b>ANTIHBc</b>	Anticuerpo core virus hepatitis B
<b>AP</b>	Riesgo anestésico prequirúrgico
<b>AST</b>	Aspartato transferasa
<b>AVD</b>	Actividades vida diaria
<b>BI</b>	Bilirrubina
<b>BMI-IMC</b>	Índice masa corporal
<b>CMV</b>	Citomegalovirus
<b>CPRE</b>	Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada
<b>CyA</b>	Ciclosporina
<b>ECG</b>	Electrocardiograma
<b>FA</b>	Fosfatasa alcalina
<b>FK506</b>	Tacrólimus
<b>GGT</b>	Gamma glutamil transpeptidasa
<b>GOT</b>	Glutámico Pirúvico Transaminasa
<b>Grupo AB0</b>	Grupos sanguíneos
<b>Hb</b>	Hemoglobina
<b>HBsAG</b>	Antígeno de superficie virus
<b>HDA</b>	Hemorragia digestiva alta
<b>HSV</b>	Herpes virus
<b>HVZ</b>	Varicela Zoster
<b>INR</b>	Razón normalizada internacional (de protrombina)
<b>IV</b>	Intravenosa
<b>LA</b>	Lista activa
<b>LE</b>	Lista espera
<b>LOE</b>	Lesión ocupante de espacio
<b>MELD</b>	Model for end-stage liver disease
<b>MELD-NA</b>	MELD sodio
<b>MM</b>	Mofetil Micofenolato
<b>NIC</b>	Código de Intervenciones de Enfermería
<b>NIVELES</b>	Niveles inmunosupresores
<b>NOC</b>	Clasificación de resultados en Enfermería
<b>ONT</b>	Organización Nacional de Trasplante

<b>PAAF</b>	Punción aspirado con aguja fina
<b>PBE</b>	Peritonitis bacteriana espontánea
<b>Pre- TX</b>	Pretrasplante
<b>RM</b>	Resonancia Magnética
<b>RVVA</b>	Registro de voluntades vitales anticipadas.
<b>SICATA</b>	Sistema información coordinación autonómica de trasplantes de Andalucía
<b>SHUNT PC</b>	Derivación porto cava
<b>SSPA</b>	Sistema Sanitario Público de Andalucía
<b>TC</b>	Tomografía computerizada
<b>TH</b>	Trasplante hepático
<b>TIPS</b>	Derivación transyugular intrahepática portosistémica
<b>TEL</b>	Técnico especialista laboratorio
<b>TER</b>	Técnico especialista de rayos
<b>TTPA</b>	Tiempo parcial de tromboplastina activada
<b>UTH</b>	Unidad de Trasplante Hepático
<b>VCM</b>	Volumen corpuscular
<b>VHA</b>	Virus Hepatitis A
<b>VHB</b>	Virus Hepatitis B
<b>VHC</b>	Virus Hepatitis C
<b>VIH</b>	Virus de inmunodeficiencia humana