



SERIE EDAFOHIGRÓFILA	
	EH4A: Geoesfera edafohigrófila supra-mesomediterránea nevadense silicícola. Faciación típica supra-mediterránea
	EH4B: Geoesfera edafohigrófila supra-mesomediterránea nevadense silicícola. Faciación termófila mesomediterránea
	EH5: Geoesfera edafohigrófila mesomediterránea mediterráneo-iberolatina y bética central basílica
	EH6: Geoesfera edafohigrófila mesomediterránea interior y termomediterránea rocaña, malacitano-almeriense, hispano-giponesa, almeriense-occidental y manchego-española mesofítica
	EH6E: Geoesfera edafohigrófila meso-termoditerránea alibética silicícola
	EH7: Geoesfera edafohigrófila termomediterránea gaditano-orubo-algarvese, jerezana y tingitana silicícola
	EH8: Geoesfera edafohigrófila termomediterránea basílica murciano-almeriense y malufense
	EH9: Mico-geoesfera edafohigrófila termomediterránea murciano-almeriense hiperbética
	EH2: Mico-geoesfera edafohigrófila termomediterránea mediterráneo-benitufésica hiperbética

  

Complejos Politelesares y Comunidades Permanentes sobre Sustratos Especiales	
	M: Complejo politelesar de vegetación edafotrófica tabernense sobre margas subalpinas
	Pea: Geoesfera edafotrófica litoral psammofítica termomediterránea mediterráneo-berrocalítica
	Pa: Geoesfera edafotrófica litoral psammofítica termomediterránea mediterráneo-berrocalítica
	Y: Complejo de vegetación edafotrófica sobre yesos de la Sierra de Cabrera
	X: Complejo de vegetación edafotrófica sobre yesos de Sorbas
	Y: Complejo de vegetación edafotrófica tabernense sobre yesos

SERIES EDAFOXERÓFILAS	
	ANu: Serie edafoxerófila termomediterránea anticlerense de la sabina caudata ( <i>Juniperus turbinata</i> ); <i>Asparagus horridus</i> - <i>Juniperus turbinata</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	CoCa: Serie edafoxerófila termomediterránea bético-rifata seco-subhúmeda basílica de algarró (Carpinus alba); <i>Quercus coccinea</i> - <i>Quercus ilex</i> S. Faciación mesomediterránea con <i>Rhamnus alaternica</i>
	AlP: Complejo edafoxerófilo meso-supramediterráneo subbético calizo-dolomítico de la sabina mora ( <i>Juniperus phoenicea</i> ) y el pino carrasco ( <i>Pinus halepensis</i> )
	AlPn: Serie edafoxerófila meso-supramediterránea subhúmeda-húmeda bética del pino salgareño y pino negro ( <i>Pinus nigra</i> )
	PaDe: Serie edafoxerófila meso-supramediterránea benimejense parafítica del pino negro ( <i>Pinus pinaster</i> subsp. <i>austriacae</i> ); <i>Pinus aculeata</i> - <i>Quercus coccinea</i> S.
	RnLp: Serie edafoxerófila meso-supramediterránea malacitano-almeriense, gaditano-baenense, rocaña y subbética basílica de la sabina mora ( <i>Juniperus phoenicea</i> ); <i>Rhamnus myrtifolia</i> - <i>Juniperus phoenicea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	RnLm: Serie edafoxerófila meso-supramediterránea malacitano-almeriense, gaditano-baenense, rocaña y subbética basílica de la sabina mora ( <i>Juniperus phoenicea</i> ); <i>Rhamnus myrtifolia</i> - <i>Juniperus phoenicea</i> S. Faciación mesomediterránea
	RnLp: Serie edafoxerófila meso-supramediterránea malacitano-almeriense, gaditano-baenense, rocaña y subbética basílica de la sabina mora ( <i>Juniperus phoenicea</i> ); <i>Rhamnus myrtifolia</i> - <i>Juniperus phoenicea</i> S. Faciación mesomediterránea
	TCo: Serie edafoxerófila termomediterránea bético-gaditana y tingitana subhúmeda-húmeda vertical de aceboche ( <i>Celastrus scouleri</i> subsp. <i>alpestris</i> ); <i>Torreya commersoniana</i> - <i>Quercus ilex</i> S.

  

SERIES CLIMATÓFILAS - Piso oromediterráneo	
	DoPa: Serie oromediterránea bética basílica de la sabina rastrera ( <i>Juniperus asper</i> ); <i>Daphne genkua</i> - <i>Pinus rostrata</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	Obu: Serie oromediterránea filibético-nevadense silicícola del centro rastrero ( <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> ); <i>genista</i> - <i>Juniperus nana</i> S.

SERIES CLIMATÓFILAS - Piso Mesomediterráneo	
	AdQm: Serie meso-supramediterránea nevadense y malacitano-almeriense silicícola del roble melojó ( <i>Quercus pyrenaica</i> ); <i>Adesoparus decoloratus</i> - <i>Quercus pyrenaica</i> S. Faciación mesomediterránea
	AdQm: Serie meso-supramediterránea filibético y nevadense silicícola de la encina ( <i>Quercus rotundifolia</i> ); <i>Adesoparus decoloratus</i> - <i>Quercus rotundifolia</i> S. Faciación mesomediterránea con <i>Rhamnus alaternica</i>
	AlQ: Serie mesomediterránea luso-estremadurana luso-estremadurana húmeda silicícola del roble melojó ( <i>Quercus pyrenaica</i> ); <i>Adesoparus decoloratus</i> - <i>Quercus pyrenaica</i> S.
	BqP: Serie meso-supramediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPm: Serie meso-supramediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPm: Serie meso-supramediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPm: Serie meso-supramediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPm: Serie meso-supramediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPm: Serie meso-supramediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPm: Serie meso-supramediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPm: Serie meso-supramediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPm: Serie meso-supramediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPm: Serie meso-supramediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPm: Serie meso-supramediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPm: Serie meso-supramediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPm: Serie meso-supramediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPm: Serie meso-supramediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPm: Serie meso-supramediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea

SERIES CLIMATÓFILAS - Piso Mesomediterráneo (Continuación)	
	RQc: Serie mesomediterránea gaditano-baenense, setabense, valenciano-lusitano y aragonesa semiarida de la coscoja ( <i>Quercus coccinea</i> ); <i>Rhamnus lycoides</i> - <i>Quercus coccinea</i> S. Faciación gaditano-baenense y almeriense con <i>Ephedra fragilis</i>
	RQc: Serie mesomediterránea gaditano-baenense, setabense, valenciano-lusitano y aragonesa semiarida de la coscoja ( <i>Quercus coccinea</i> ); <i>Rhamnus lycoides</i> - <i>Quercus coccinea</i> S. Faciación gaditano-baenense y almeriense con <i>Ephedra fragilis</i>
	SeQ: Serie mesomediterránea luso-estremadurana y ribagorzana subhúmeda-húmeda silicícola del alcornoque ( <i>Quercus suber</i> ); <i>Sanguisorbo agrifolius</i> - <i>Quercus suber</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	SeQ: Serie mesomediterránea luso-estremadurana y ribagorzana subhúmeda-húmeda silicícola del alcornoque ( <i>Quercus suber</i> ); <i>Sanguisorbo agrifolius</i> - <i>Quercus suber</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	SeQ: Serie mesomediterránea luso-estremadurana y ribagorzana subhúmeda-húmeda silicícola del alcornoque ( <i>Quercus suber</i> ); <i>Sanguisorbo agrifolius</i> - <i>Quercus suber</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	TQc: Serie mesomediterránea alibético-tingitana húmeda-hiperhúmeda del alcornoque ( <i>Quercus suber</i> ); <i>Torreya commersoniana</i> - <i>Quercus suber</i> S.

  

SERIES CLIMATÓFILAS - Piso supramediterráneo	
	AdQs: Serie supra-mediterránea nevadense y malacitano-almeriense silicícola del roble melojó ( <i>Quercus pyrenaica</i> ); <i>Adesoparus decoloratus</i> - <i>Quercus rotundifolia</i> S.
	AdQs: Serie supra-mediterránea nevadense y malacitano-almeriense silicícola del roble melojó ( <i>Quercus pyrenaica</i> ); <i>Adesoparus decoloratus</i> - <i>Quercus rotundifolia</i> S.
	AlQs: Serie supra-mediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPs: Serie supra-mediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPs: Serie supra-mediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPs: Serie supra-mediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPs: Serie supra-mediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPs: Serie supra-mediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea
	BqPs: Serie supra-mediterránea algarvese-gaditana, filibético-nevadense y almeriense, semiarido-seca del lentisco ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Buphonia gibraltarica</i> - <i>Platanus lenticea</i> S. Faciación típica supra-mediterránea

SERIES CLIMATÓFILAS - Piso termomediterráneo	
	CRS: Serie termomediterránea superior murciano-almeriense semiarida del lentisco ( <i>Quercus rotundifolia</i> ); <i>Chamaecrista nuda</i> - <i>Rhamnus lycoides</i> S.
	MQ: Serie termomediterránea inferior almeriense occidental semiarida del arto ( <i>Quercus ilex</i> ); <i>Myrica maritima</i> - <i>Quercus ilex</i> S.
	MoQ: Serie termomediterránea marplatense-monchiquense y bética seco-subhúmeda silicícola de la encina ( <i>Quercus rotundifolia</i> ); <i>Myrica communis</i> - <i>Quercus rotundifolia</i> S.
	MoQ: Serie termomediterránea marplatense-monchiquense y bética seco-subhúmeda silicícola de la encina ( <i>Quercus rotundifolia</i> ); <i>Myrica communis</i> - <i>Quercus rotundifolia</i> S.
	MaPa: Serie termomediterránea inferior almeriense semiarido-árida del lentisco ( <i>Quercus suber</i> ); <i>Myrica communis</i> - <i>Quercus suber</i> S.
	MoQ: Serie termomediterránea marplatense-monchiquense y bética seco-subhúmeda silicícola del alcornoque ( <i>Quercus suber</i> ); <i>Myrica communis</i> - <i>Quercus suber</i> S.
	MoQ: Serie termomediterránea marplatense-monchiquense y bética seco-subhúmeda silicícola del alcornoque ( <i>Quercus suber</i> ); <i>Myrica communis</i> - <i>Quercus suber</i> S.
	MoQ: Serie termomediterránea marplatense-monchiquense y bética seco-subhúmeda silicícola del alcornoque ( <i>Quercus suber</i> ); <i>Myrica communis</i> - <i>Quercus suber</i> S.
	MoQ: Serie termomediterránea marplatense-monchiquense y bética seco-subhúmeda silicícola del alcornoque ( <i>Quercus suber</i> ); <i>Myrica communis</i> - <i>Quercus suber</i> S.

SERIES CLIMATÓFILAS - Piso Criomediterráneo	
	EFF: Serie criomediterránea nevadense silicícola de <i>Festuca clementis</i> ; <i>Eriophorum rigosum</i> - <i>Festuca clementis</i> S.

  

Signos convencionales	
	Autovía
	Carretera RIQE
	Núcleos de población
	Ríos
	Embalses
	Límite de provincia

Datos botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz:  
**SERIE DE VEGETACIÓN**

1:800.000

0 10 20 30 40 kilómetros

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Mapa 1

10 0 10 20 30 40 kilómetros

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

10 0 10 20 30 40 kilómetros