Series de Vegetación Edafohigrófilas

- EH1 — Microgeoserie edafohigrófila oromediterranea nevadense silícicola
- EH2 — Microgeoserie edafohigrófila oromediterránea nevadense silícicola
- EH3 — Microgeoserie edafohigrófila oromediterránea subbética y serrano-béticas basófila
- EH4A — Geoserie edafohigrófila supra-mesomediterránea nevadense silícicola. Faciación típica supramediterránea
- EH4B — Geoserie edafohigrófila supra-mesomediterránea nevadense silícicola. Faciación termófila mesomediterránea
- EH5 — Geoserie edafohigrófila supramediterránea ibérica basófila
- EH6 — Geoserie edafohigrófila supra-mesomediterránea ronceña y malacitano-almijarense serpentinícola y dolomítícola
- EH7 — Geoserie edafohigrófila meso-termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica silícicola
- EH8 — Geoserie edafohigrófila mesomediterránea mediterráneo-iberoiranitna y bética oriental basófila
- EH9 — Geoserie edafohigrófila mesomediterránea inferior y termomediterránea hispalense basófila
- EH10 — Geoserie edafohigrófila mesomediterránea inferior y termomediterránea ronderia, malacitano-almijarense, alpujarreño-gadorense, almeriense-occidental y murchego-espunense mesótrofa
- EH11 — Geoserie edafohigrófila mesomediterránea mediterráneo-iberoiranitna meridional mesohalófila
- EH13 — Geoserie edafohigrófila meso-termomediterránea hispalense mesohalófila
- EH14 — Geoserie edafohigrófila meso-termomediterránea ronderia, malacitano-almijarense y alcajamiña sobre aluviones inestables serpentinícola y dolomítícola
- EH15 — Geoserie edafohigrófila meso-termomediterránea ibérica sobre aluviones inestables basófila
- EH18 — Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila murciano-almeriense y mulutiense
- EH4A — Geoserie edafohigrófila supra-mesomediterránea nevadense silícicola. Faciación típica supramediterránea
- EH4B — Geoserie edafohigrófila supra-mesomediterránea nevadense silícicola. Faciación termófila mesomediterránea
- EH8 — Geoserie edafohigrófila mesomediterránea mediterráneo-iberoiranitna y bética oriental basófila
- EH10 — Geoserie edafohigrófila mesomediterránea inferior y termomediterránea ronderia, malacitano-almijarense, alpujarreño-gadorense, almeriense-occidental y murchego-espunense mesótrofa
- EH12 — Microgeoserie edafohigrófila mesomediterránea guadciano-bastetana hiperhalófila
- EH16 — Geoserie edafohigrófila meso-termomediterránea alíbica silícicola
- EH16+RhQc — Geoserie edafohigrófila meso-termomediterránea alíbica silícicola + Serie termo-mesomediterránea alíbico-tingitana húmedo-hiperhúmeda silícicola del quejigo andaluz (Quercus canariensis): Ruscohypophylli-Quercetum canariensis S.
- EH17 — Geoserie edafohigrófila termomediterránea gaditano-onubo-algarviense, jerezana y tingitana silícicola
- EH18 — Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila murciano-almeriense y mulutiense
- EH19 — Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea murciano-almeriense hiperhalófila
- EH20 — Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica hiperhalófila

Signos convencionales

- Autovía
- Carretera RGE
- Núcleos de población
- Límite de provincia
- Ríos
- Embalses

En este mapa aparecen cartografiados tramos correspondientes a geoseries, microgeoseries y tan sólo eventualmente series de vegetación, por lo que el título del mapa referido a series no corresponde plenamente con su contenido.

Existe una heterogeneidad en cuanto al areal cartografiado en las diversas geoseries, ya que el aspecto poligonal sólo es aplicable a las microgeoseries EH3, EH12, EH19 y EH20. En el resto, el areal ocupado sería lineal, observándose errores en el área occidental de Andalucía, correspondientes a las geoseries EH10, EH16 y EH17. Por otra parte, hay extensas áreas de las provincias de Cádiz, Málaga y Almería desprovistas de la cartografía de sus ríos.

- EH3: Esta microgeoserie es muy puntual, pero merecería destacarse su presencia en algunas lagunas de la alta montaña subbética (Sierras de Cazorla, Segura, Castril, etc).
- EH5: El área de distribución de esta geoserie es mayor de lo que se representa en el mapa, especialmente en las provincias más orientales con mayores altitudes (Jaén, Granada).
- EH6: El área de distribución de esta geoserie es mayor de lo que se representa en el mapa, estando poco cartografiada en las provincias de Málaga y Cádiz. Convendría además distinguir la faciación serpentinícola de esta geoserie.
- EH7: Convendría distinguir cartográficamente las faciaciones típica EH7a y la termófila EH7b.
- EH10: El área de distribución de esta geoserie es mayor de lo que se representa en el mapa, especialmente en las provincias más orientales y térmicas (Granada y Almería). Convendría además distinguir la faciación serpentinícola de esta geoserie.
- EH14: El área de distribución de esta geoserie es mayor de lo que se representa en el mapa, especialmente en la provincia de Málaga. Convendría además distinguir la faciación serpentinícola de esta geoserie.
- EH15: El área de distribución de la geoserie EH15 es mayor de lo que se representa en el mapa, especialmente en las provincias más orientales y térmicas (Almería).
- EH16: Se ha de independizar esta geoserie de la serie climatófila de *Ruusco hypophylli-Quercetum canariensis*. Esto permitiría una representación cartográfica lineal y homogénea con el resto. Esta geoserie de distribución alíjibica no se halla presente en los territorios al norte de la desembocadura del Guadalquivir en la provincia de Huelva. Existe un tramo erróneamente cartografiado, que corresponde realmente a la geoserie EH17.
- EH17: El gran polígono del río Guadalquivir cercano a su desembocadura que se identifica como esta geoserie corresponde en realidad a una mezcla de las geoseries EH9 y EH13 junto con comunidades halófilas, en ocasiones poco conformadas, de la microgeoserie EH20.

Datos botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz:
SERIES DE VEGETACIÓN EDAFOHIGRÓFILAS

Mapa 2

1:800.000

10 0 10 20 30 40 kilómetros

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

JUNTA DE ANDALUCIA