

Aljibico	
AJ1	McQs. Modelo aljibico de <i>Myrta communis-Querceto suberis</i> S.
AJ2	TbQs. Modelo aljibico de <i>Teucrio baeticus-Querceto suberis</i> S.
AJ3	TcOs. Modelo aljibico de <i>Tamo communis-Cleto sylvestris</i> S.
AJ4	OQs. Modelo aljibico de <i>Oleo sylvestris-Querceto suberis</i> S.
AJ5	Psa. Modelo aljibico para zonas de vegetación litoral psammofila.
AJ6	LbQs. Modelo aljibico de <i>Luzulo baeticus-Querceto pyrenaica</i> S.

Almijarense	
AL1	BgPl. Modelo almijarense de <i>Bupleuro gibraltari-Plantago lenticis</i> S.
AL2	SmQr. Modelo almijarense de <i>Smilaco mauritanica-Querceto rotundifoliae</i> S. Faciación sobre esquistos con <i>Cytisus malacitanus</i> .
AL3	SmQr. Modelo almijarense de <i>Smilaco mauritanica-Querceto rotundifoliae</i> S.
AL4	PcQr. Modelo almijarense de <i>Paeonio coriaceus-Querceto rotundifoliae</i> S. Faciación típica.
AL5	PcQr.ma. Modelo almijarense de <i>Paeonio coriaceus-Querceto rotundifoliae</i> S. Faciación malacitano-axarquiense y bermejense.
AL6	AdQr.m. Modelo almijarense de <i>Adenocarpus decorticans-Querceto rotundifoliae</i> S. Faciación mesomediterránea.
AL8	AdQr.s. Modelo almijarense de <i>Adenocarpus decorticans-Querceto rotundifoliae</i> S. Faciación típica supramediterránea.
AL9	BhQr. Modelo almijarense de <i>Berberido hispanicae-Querceto rotundifoliae</i> S.
AL10	DePs. Modelo almijarense de <i>Daphno oleoidis-Pineteto sylvestris</i> S.

Anticariense	
AN1	PcQr. Modelo anticariense de <i>Paeonio coriaceus-Querceto rotundifoliae</i> S. Faciación típica.
AN2	BhQr. Modelo anticariense de <i>Berberido hispanicae-Querceto rotundifoliae</i> S.
AN3	RmJp. Modelo anticariense de <i>Rhamno myrtifolii-Junipereto phoeniceae</i> S. Faciación típica.

Bermejense	
BE1	SmQr. Modelo bermejense de <i>Smilaco mauritanica-Querceto rotundifoliae</i> S.
BE2	McQs. Modelo bermejense de <i>Myrta communis-Querceto suberis</i> S.
BE3	TbQs. Modelo bermejense de <i>Teucrio baeticus-Querceto suberis</i> S.
BE4	PaQs. Modelo bermejense de <i>Pino acutissimus-Querceto cocciferae</i> S.
BE5	BmAp. Modelo bermejense de <i>Bunio masouae-Abieteto pisaepo</i> S. Faciación supramediterránea.
BE6	RmJp.o. Modelo bermejense de <i>Rhamno myrtifolii-Junipereto phoeniceae</i> S. Faciación occidental con <i>Rhamnus oleoides</i> .
BE7	PcQr.ma. Modelo bermejense de <i>Paeonio coriaceus-Querceto rotundifoliae</i> S. Faciación malacitano-axarquiense y bermejense.
BE8	PcQr. Modelo bermejense de <i>Paeonio coriaceus-Querceto rotundifoliae</i> S. Faciación típica.

Hispalense	
HI1	PcQr.I. Modelo hispalense de <i>Paeonio coriaceus-Querceto rotundifoliae</i> S. Faciación termofila bética con <i>Pistacia lentiscus</i> .
HI2	PcQs. Modelo hispalense de <i>Paeonio coriaceus-Querceto rotundifoliae</i> S. Faciación típica.
HI3	SmQr. Modelo hispalense de <i>Smilaco mauritanica-Querceto rotundifoliae</i> S.

Malacitano-Axarquiense	
MA1	SmQr. Modelo malacitano-axarquiense de <i>Smilaco mauritanica-Querceto rotundifoliae</i> S.
MA2	RmJp.o. Modelo malacitano-axarquiense de <i>Rhamno myrtifolii-Junipereto phoeniceae</i> S. Faciación occidental con <i>Rhamnus oleoides</i> .
MA3	PcQr.ma. Modelo malacitano-axarquiense de <i>Paeonio coriaceus-Querceto rotundifoliae</i> S. Faciación malacitano-axarquiense y bermejense.


  

Rondense	
RO1	PcQr. Modelo rondense de <i>Paeonio coriaceus-Querceto rotundifoliae</i> S. Faciación típica.
RO2	SmQr. Modelo rondense de <i>Smilaco mauritanica-Querceto rotundifoliae</i> S.
RO3	TbQs. Modelo rondense de <i>Teucrio baeticus-Querceto suberis</i> S.
RO4	DlAg. Modelo rondense de <i>Daphno latifoliae-Aceto granatensis</i> S.
RO5	PhAp. Modelo rondense de <i>Paeonio broteri-Abieteto pisaepo</i> S.
RO6	DePs. Modelo rondense de <i>Daphno oleoidis-Pineteto sylvestris</i> S.
RO7	AhL. Modelo rondense de <i>Asparago horridi-Junipereto turbinatae</i> S.
RO8	RmJp.o. Modelo rondense de <i>Rhamno myrtifolii-Junipereto phoeniceae</i> S. Faciación occidental con <i>Rhamnus oleoides</i> .

Subbético-Maginsense	
SU1	PcQr.I. Modelo subbético-maginsense de <i>Paeonio coriaceus-Querceto rotundifoliae</i> S. Faciación termofila bética con <i>Pistacia lentiscus</i> .
SU2	PcQr. Modelo subbético-maginsense de <i>Paeonio coriaceus-Querceto rotundifoliae</i> S. Faciación típica.

Signos convencionales			
	Autovía		Núcleos de población
	Carretera RIGE		Límite de provincia
	Red básica		Embalses
	Ríos		



**Datos botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz:**  
**MODELOS DE GESTIÓN DE LA VEGETACIÓN Y SERIES DE VEGETACIÓN**  
**Mapa 9. Málaga**

1:400.000  
 0 5 10 20 30 Km

**CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE**  
**JUNTA DE ANDALUCÍA**