

# 2017

Planta del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	<b>NOV</b>	DIC

# Quitameriendas

*Merendera montana* (L.) Lange



*Viola cazorleensis*



JARDÍN BOTÁNICO TORRE DEL VINAGRE

P. N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Coto Río. Jaén



RED ANDALUZA  
JARDINES BOTÁNICOS  
EN ESPACIOS NATURALES



## ¿Cómo es?

Especie bulbosa de tamaño comprendido entre los 7 y 20 cm. Túnicas pardas, prolongadas por encima del tuberobulbo. Vaina membrácea apiculada, blanco-verdosa. Hojas lineares, generalmente acanaladas y con el margen en ocasiones ondulado, que aparecen tras la floración. Posee 1 o 2 flores por bulbo, actinomorfas, hermafroditas, trímeras; tépalos libres, elípticos u oblongo-elíptico, de ápice obtuso por lo general y color lila intenso hacia el ápice y blanquecino hacia la base; 6 estambres, con anteras basifijas, amarillas y ovario súpero con 3 estilos libres. Los frutos son pequeñas cápsulas con un tamaño inferior a 12 mm.

## ¿Dónde crece?

Forma parte de la vegetación pascícola, pratense climática y pastizales subnitrófilos. Su presencia es abundante en lugares pisoteados, secos y pedregosos. Se distribuye entre los 500 y 2000 m, pudiendo llegar hasta los 2500 m.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

Torre del Vinagre - Carretera del Tranco km. 48; 23478 Coto Ríos (Jaén) - Tfno: 953 71 30 29 - jbotanico.tvinagre.cmaot@juntadeandalucia.es

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJAS												
FLORES												
FRUTOS												

## ¿Dónde podemos encontrarla?

Especie ampliamente distribuida por las zonas montañosas de toda Europa. En Andalucía se encuentra en la mayor parte del territorio.

## ¿Sabías qué?

En otra época más antigua, cuando las actividades rurales no se regían por un calendario oficial sino por el paso de las estaciones, la floración de la merendera anunciaba la llegada del final del verano y con ella, la llegada de la época de recogida de la cosecha, de los frutos de los árboles y muchas otras actividades agrícolas y ganaderas.



Su nombre hace referencia a la sustitución de la merienda por una cena temprana con la llegada del otoño, puesto que los días se hacen más cortos. En otros lugares de la Península se la conoce con el nombre de espachapastores, aludiendo al comienzo de la trashumancia hacia las tierras bajas cuando florece.

Esta especie contiene colchicina, una sustancia tóxica que mantiene a los depredadores alejados. Su concentración es mayor en las hojas.

*¿Quieres visitar el jardín?*

Pincha aquí 



Unión Europea  
Fondo Europeo Agrícola  
de Desarrollo Rural



JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO