

# Quejigar

Entre las provincias de Cádiz y Málaga (en lo que se conoce como el sector rondeño), el bosque típico de quejigo (*Quercus faginea* subsp. *faginea*) se desarrolla sobre suelos calizos. Prefiere los fondos de valle y las zonas de umbría, y se sitúa entre los 300 m y los 1500 m de altitud.

El quejigo suele ser el único árbol de estos bosques, es decir, son formaciones monoespecíficas. En ocasiones, se codea con pinsapos (*Abies pinsapo*), arces (*Acer monspessulanum* y *A. opalus* subsp. *granatensis*), mostajos (*Sorbus aria*), encinas (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) y durillos (*Viburnum tinus*). Entre los arbustos de su sotobosque se encuentran majuelos (*Crataegus monogyna*), coronillas (*Coronilla valentina*), escobones (*Cytisus arboreus*) y ruscos (*Ruscus aculeatus*). Y entre las hierbas, abundan orquídeas (*Barlia robertianum*, *Cephalanthera longifolia*, *Epipactis tremolsii*), helechos como el polipuí (*Polipodium cambricum*), loniceras (*Lonicera implexa*), clemátides (*Clematis vitalba*), heléboros (*Helleborus foetidus*) y peonías (*Paeonia broteroi* y *P. coriacea*).

Tradicionalmente, los quejigos se han utilizado para el carboneo, una actividad que infligía al árbol severos daños. El hueco interior que, prácticamente, vacía por dentro sus troncos es la cicatriz visible que aún es posible distinguir en los ejemplares más longevos.



*Digitalis purpurea*



*Verbascum erosum*



*Epipactis tremolsii*



*Arum italicum*



*Clematis vitalba*