

H-18.3 VALORACIÓN Y CUIDADOS EN EL DOLOR

Fecha de revisión: 19-abr-11

VALORACION DEL DOLOR EN NIÑOS DE 0-3 AÑOS

Indicador	0	1	2	3
Edad gestacional	36 Semanas o más	32-35 Semanas + 6 días	28-31 Semanas + 6 días	28 Semanas o menos
Observar durante 15 segundos				
Comportamiento	Despierto/Activo Ojos abiertos Movimientos faciales	Despierto/Quieto Ojos abiertos No movimientos faciales	Dormido/Activo Ojos cerrados Movimientos faciales	Dormido/Quieto Ojos cerrados No movimientos faciales
Observar durante 30 segundos				
Frecuencia cardíaca máxima	Aumento 0-4 latidos/minuto	Aumento 5-14 latidos/minuto	Aumento 15-24 latidos/minuto	Aumento de 25 ó más latidos/minuto
Disminución Saturación de oxígeno	0-2.4 %	2.5-4.9 %	5-7.4 %	Más de 7.5 %
Cejas fruncidas	No 0-3 segundos	Mínimo > 3-12 segundos	Moderado >12-21 segundos	Máximo > 21-30 segundos
Ojos apretados	No 0-3 segundos	Mínimo > 3-12 segundos	Moderado >12-21 segundos	Máximo > 21-30 segundos
Surco nasolabial	No 0-3 segundos	Mínimo > 3-12 segundos	Moderado >12-21 segundos	Máximo > 21-30 segundos
Puntaje Total				

0	6	12	21
No dolor	Dolor moderado	Dolor intenso	

Fuentes:

- Mathew, P.J. & Mathew, J.L.: *Assessment and management of pain in infants*. Review. PMJ 2003; 79: 438.
- Porter, F.L.; Wolf, C.M.; Gold J.; Lotsoff, D. & Millar, J.P.: *Pain and pain management in newborn infants: A survey of physicians and nurses*. Pediatrics 1997; 100: 626-32