

INFORME SOBRE LA VIGILANCIA AMBIENTAL DEL MATERIAL GENÉTICO DE SARS-CoV-2 EN LAS AGUAS RESIDUALES DE ANDALUCÍA

Semana 32/ 2022: semana 31 (01- 07 agosto 2022) vs. semana 30 (25- 31 julio 2022)

Justificación

En la Comunidad Autónoma de Andalucía se crea la Red Andaluza de Vigilancia de Aguas Residuales (RAVAR) como indicador de alerta temprana de la propagación de COVID-19 de la que se toma conocimiento por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 7 de julio de 2020 (BOJA nº 132, viernes 10 de julio 2020).

Con la información obtenida a través de esta red, y siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea (Recomendación (UE) 2021/ 472 de la Comisión de 17 de marzo de 2021), las Delegaciones Territoriales realizan informes quincenales a partir de resultados semanales en las ocho provincias andaluzas, que han permitido hasta ahora, un análisis de tendencias en los distintos territorios. Ahora, este informe semanal andaluz tiene el objetivo de aunar la información de forma que se obtenga una visión conjunta de este indicador en nuestra Comunidad Autónoma.

Con los datos suministrados por los distintos gestores de aguas que toman muestra en la entrada de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) y nodos de la red de saneamiento de ocho municipios de Almería, nueve municipios de Sevilla y en las capitales de provincia de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, el Servicio de Salud Ambiental emite el presente informe, que es elaborado con el objetivo principal de ser una herramienta útil en la vigilancia epidemiológica de la propagación de COVID-19 en la población andaluza.

Datos de la técnica empleada en el análisis de las aguas residuales

Mediante RT-qPCR se cuantifican las copias de fragmentos de genes víricos presentes en las muestras de aguas residuales (Randazzo *et al.* 2020). La técnica empleada se ajusta al protocolo publicado por el CSIC “Detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales (Versión 1.11, noviembre 2020)”.

Criterios para evaluar la evolución de los datos obtenidos en las aguas residuales

Los resultados obtenidos como copias genómicas de SARS-CoV-2 por litro (cg/l) se expresan en escala logarítmica (\log_{10}). La variación de los datos entre la semana actual y la anterior en cada punto de muestreo nos permite determinar la evolución. Según el valor de esta diferencia, se establecen las siguientes categorías de variación:

Variación	Unidades logarítmicas de diferencia
Aumento significativo	Más de +1
Aumento	Entre + 0,4 y +1
Estable	Entre - 0,4 y + 0,4
Disminución	Entre - 0,4 y -1
Disminución significativa	Menos de -1





Nota aclaratoria: 1. Los resultados informados como “ausencia” o “indetectable” se consideran negativos y con valor cuantitativo cero. Los resultados informados como “presencia” se consideran positivos y, por consenso, con valor cuantitativo de 1 Log(10) copias genómicas/litro. En ambos casos el resultado obtenido es inferior al límite de cuantificación de la técnica analítica; 2. En caso de cuantificar varias dianas del virus se tomará el resultado más alto si bien la variación se obtiene como diferencia promedio de todas las dianas.

Resultados

Esta semana el resultado sigue siendo positivo en todas las EDARs muestreadas (N=15). En el análisis cuantitativo comparativo de los datos obtenidos la semana pasada (01- 07 agosto 2022) respecto a la semana anterior (25- 31 julio 2022) se determina estabilidad en el 66,7% de las depuradoras analizadas, disminución en el 20%, siendo en un caso significativa, y aumento en el 13,3% restante.

Tabla 1. Variación de la carga genómica de SARS-CoV-2 a la entrada de las EDARs.

Código EDAR	Punto de muestreo	Denominación/ Localización	Provincia	Resultado SARS-CoV-2 semana 31 (copias genómicas/litro)	Variación sem 31 vs. 30	Diferencia Log (10)
51V	EDAR	El Bobar	Almería	4,7x10 ⁵	Estable	-0,31
07	EDAR	Roquetas de Mar	Almería	3,7x10 ⁵	Estable	+0,29
49V	EDAR	Cádiz- San Fernando	Cádiz	2,3x10 ⁶	Estable	+0,14
47V	EDAR	Jerez de la Frontera	Cádiz	8,3x10 ⁵	Estable	-0,40 ¹
05	EDAR	La Golondrina	Córdoba	1,2x10 ⁶	Estable	+0,04
04V	EDAR	Granada Sur	Granada	1,3x10 ⁶	Estable	+0,06
50V	EDAR	Huelva	Huelva	7,4x10 ⁴	Disminución significativa	-1,11
48V	EDAR	Santa Catalina	Jaén	6,8x10 ⁵	Estable	+0,05
09	EDAR	Peñón del Cuervo	Málaga	9,6x10 ⁵	Aumento	+0,60
10	EDAR	Guadalhorce	Málaga	1,3x10 ⁶	Aumento	+0,59
11	EDAR	Copero	Sevilla	6,3x10 ⁴	Estable	-0,24
12	EDAR	Ranilla	Sevilla	1,7x10 ⁴	Disminución	-0,70
13	EDAR	San Jerónimo	Sevilla	1,0x10 ⁵	Disminución	-0,56
14	EDAR	Tablada	Sevilla	9,5x10 ⁴	Estable	-0,32
15	EDAR	Mairena- El Viso	Sevilla	1,3x10 ⁵	Estable	+0,07

Datos Red VATAR: El Bobar, Cádiz- San Fernando, Jerez de la Frontera, Granada Sur, Huelva y Santa Catalina. Datos Red RAVAR: Roquetas de Mar HIDRALIA; Datos Peñón del Cuervo y Guadalhorce EMASA; Datos Copero, Ranilla, San Jerónimo, Tablada y Mairena-El Viso EMASESA; ND: no detectable. ¹Disparidad significativa entre las distintas dianas analizadas, se debe tomar este resultado de variación con cautela.





Por provincia:

En **Almería**, El Bobar y Roquetas de Mar (en aumento la semana pasada) están estables.

Cádiz, Córdoba y **Granada** continúan en estabilidad.

Huelva, estable la pasada, esta semana muestra disminución significativa.

Jaén, en disminución la semana pasada, se estabiliza la presente.

En **Málaga**, tanto este como oeste, se produce un aumento aunque en ningún caso es significativo.

En **Sevilla**, disminución en 2/5, la semana pasada era predominante, que no es significativa en ningún caso.

Figura 2. Representación geográfica de los puntos de muestreo (QGIS 3.16).



Resumen

Situación similar a la semana pasada en términos generales, la estabilidad sigue siendo mayoritaria. Destacar el aumento en Málaga este y oeste, y la disminución significativa en Huelva.

